

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: YURI OLIVEIRA GALINDO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 15-01-2026

Idade: 29 anos

Peso: 83 kg

Altura: 1,78 m

Médico Solicitante: DRA. MARIA AMALIA OLIVEIRA LEITE

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 15/01/2026 21:34 e finalizado às 16/01/2026 05:50.

A latência para início do sono foi de --- min e a latência para o sono REM de **22,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 367,0 min, com eficiência do sono de **75,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,2 %** de estágio N1, **55,2 %** de estágio N2, **21,1 %** de estágio N3 e **21,5 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 120,2 min. Ocorreram 106 despertares, sendo o índice de **13,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 98, sendo 5 apneias obstrutivas, 1 apneias centrais, 0 apneias mistas, 92 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **16,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 11,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 17,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 16,0 (nº/h), sendo 1,0 apneia/h e 15,0 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 95%, a **média** de 94% e a **mínima** de 91%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 2,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 6,8 (nº/h) e em NREM foi de 2,5 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**16,0 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**91%**);
3. início do sono em N2 (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**22,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**75,3 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **13,0 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**2,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**55,2 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**21,1 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**21,5 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve intermitente verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

DADOS DO PACIENTE:

Nome: YURI OLIVEIRA GALINDO

ID: 0

Altura: 1,78 m

Peso: 83 kg

Sexo: Masculino

Data de Nascimento: 8-8-1996

IMC: 26,20

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:34:23

Data do Exame: 15-01-2026

Médico Solicitante: DRA. MARIA AMALIA OLIVEIRA LEITE

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	15/01/2026 21:34
Data/Horário de Término:	16/01/2026 05:50
Tempo Total de Registro (TTR):	487,2
Tempo Total de Sono (TTS):	367,0
Latência para o início do sono:	---
Latência para o sono REM:	22,5
Tempo acordado após o adormecer:	120,2
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	75,3 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	8,0	202,5	77,5	79,0	120,5
% de TTS	2,2	55,2	21,1	21,5	24,7

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	106	13,0

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	66,3	78
NREM	63,3	110
Vigília	68,2	110

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	1	5	0	6	92	98	0	98
Índice	0,2	0,8	0,0	1,0	15,0	16,0	0,0	16,0
Índice em REM	0,0	0,8	0,0	0,8	10,6	11,4	0,0	11,4
Índice em NREM	0,2	0,8	0,0	1,0	16,3	17,3	0,0	17,3
Duração máx (seg)	14,3	23,8	0	23,8	31,1	31,1	0	31,1
Duração média (seg)	14,3	16,5	0	15,4	15,1	15,3	0	15,3
Índice em Supino	0	0	0	0	18,5	18,5	0	18,5
Índice em Não Supino	0,2	0,8	0,0	1,0	15,0	16,0	0,0	16,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 16,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 16,0 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	91%
NREM:	94%	92%
REM:	94%	91%
Vigília:	95%	88%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 94%


Total de dessaturações: 21


"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	1	0
DIREITO	0	0	0	4	0
ESQUERDO	0	1	0	6	0
SUPINO	0	0	0	1	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	1	0	18	0
DIREITO	0	1	0	20	0
ESQUERDO	1	0	0	30	0
SUPINO	0	0	0	2	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	75,3 %	≥85%
Latência para o início do sono	--- min	até 30 min.
Latência para o sono REM	22,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	2,2 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	55,2 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	21,1 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	21,5 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	24,7 %	5%
Índice de despertares	13,0 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	16,0 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h