

modem: WD8738584807C
unid: H3692534877EA

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J366 92.1805104

RENATO FRANCISCO ROTTA

IDADE: 59 PESO: 80 ALTURA: 1.75 PROFISSÃO: comerciante
SINTOMAS: Ronco / Refluxo / mal hálito /
QUEIXAS: Arritmia / tosse à noite /
MEDICAMENTOS: Naprox / Pressat / Glifage / Amiodarona / Xarelto

MÉDICO: Dr. Zampira / Dr. Erika

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: S (19)

HORA QUE DORME: 20:30 HORA QUE ACORDA: 4h

COCHILHO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM ☒ X NA SEMANA () NÃO F. Semana

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3 a 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 68.4 e/lv SPO2: 84%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: CPAP 3.3 e/lv spO2 84%

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não IMC: 41.5

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS Dc degenerativa coluna lombar

08/08 - Avaliação max. D. wear + CPAP Dream Station

15/08 - Consulta agenda da p/ 13:30

24 tentativa de contato s/ sucesso

19/08 melhora do ronco; melhora da tosse.
Ainda s/ conexão Natália

22/07 P = 7.5 cmH2O - (De 30d utilizou 18d.)
IAH = 2.3 e/lv 30% q uso acima 4h.
m. de uso: 4h42' - Troco filtro
fuga = 10" - Ana.



Clinica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Renato Francisco Rotta

EXAME nº: 5615

SOLICITADO POR: Dra. Érika Olivier Vilela Bragança

DATA: 14/05/2024

IDADE: 59 anos

Comentários:

Exame iniciado às 20h58min e concluído às 05h16min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 71 minutos. O tempo total de sono foi de 421 minutos (07h01min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 85,1%. A distribuição do sono mostrou 16,4% de estágio 1, 57,5% de estágio 2, 9% de estágio 3 e 17,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 59,5 minutos em vigília, ocorreram 185 microdespertares (índice: 26,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 68,4/hora, sendo 2,4 apneia/hora e 66 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 68,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 84%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (68,4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (68,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 75 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (71 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono (85,1%, normal: 85% ou acima) permanecer no limite da normalidade, o sono foi fragmentado microdespertares (índice: 26,4/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (16,4%; normal: 8-10%) e 2 (57,5%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (9%; normal: 10-12%) e REM (17,1%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 13 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico do Sono



Clinica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Renato Francisco Rotta

EXAME nº: 5615-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa

DATA: 01/07/2024

IDADE: 59 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 20h54min e concluído às 04h13min. A latência para o sono foi de 31 minutos e a latência para o estágio REM, de 161 minutos. O tempo total de sono foi de 325 minutos (05h25min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 73,8%. A distribuição do sono mostrou 11,5% de estágio 1, 67,8% de estágio 2, 7,8% de estágio 3 e 12,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 84,5 minutos em vigília, ocorreram 69 microdespertares (índice: 12,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0,9/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 3,3/hora, sendo 0,4 apneia/hora e 3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 3,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 95% e a mínima de 84%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 7,5 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (3,3/hora; índice normal: 4/hora) e de distúrbio respiratório (3,3/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e alguns eventos de arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 47; máxima: 63 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente demorou a adormecer (latência para o sono: 31 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (161 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 73,8%; normal: 85% ou acima), mas o índice microdespertares (12,7/hora; normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,5%; normal: 8-10%) e 2 (67,8%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (7,8%; normal: 10-12%) e REM (12,8%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (0,9/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69.730 - RQE 40.178

enc. A1 clinica monitoragem res/cpap