

ADRIANA LUCIA GOMES			
MEDICAMENTOS:	Em anexo		
SINTOMAS/QUEIXAS	DM / HAS / colesterol /		
BANHEIRO	4 a 5X. (volta a dormir rápido)		
HORA QUE ACORDA	06 h		
HORA QUE DORME	23 h		
Respiração	Nasal (dia de)		103,5 / per
PRATICA EXERCICIO	3X semana - funcional.		SpO ₂ = 64%
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
20/12	Higiênização		
22	Ponto forçeps.		

Nome: ADRIANA LUCIA GOMES ALVES

Data de Nascimento: 14-7-1963

IMC: 29,06

Sexo: Feminino

Data do exame: 20-11-2022

Peso: 83 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DR. GUSTAVO BITTAR CUNHA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 20-11-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 514,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 6,5 e 155,5 minutos. O tempo total de sono foi de 413,5 min, eficiência de 80,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 68,0%; estágio N3: 4,1%; sono REM: 25,5%. O índice de despertares foi de 60,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 103,5/hora, sendo 165 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 158 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 64%, permanecendo 12,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 83 bpm e NREM de 54 - 82 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N2 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 103,5/hora; 5/ev
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=64%); ↑ 94 - 100%
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,9/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157