

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MILTON KAWAKAMI

Sexo: Masculino

Data do Exame: 15-09-2025

Idade: 49 anos

Peso: 96 kg

Altura: 1,76 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 15/09/2025 21:42 e finalizado às 16/09/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de **79,0** min e a latência para o sono REM de **186,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 296,0 min, com eficiência do sono de **61,5 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **4,7 %** de estágio N1, **68,4 %** de estágio N2, **10,6 %** de estágio N3 e **16,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 106,0 min. Ocorreram 226 despertares, sendo o índice de **28,2 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 305, sendo 6 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 299 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **61,8 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 91,3 e o IDR durante o sono NREM foi de 56,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 61,8 (nº/h), sendo 1,2 apneia/h e 60,6 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina** (SAO₂) **basal** foi 93%, a **média** de 90% e a **mínima** de 67%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 37,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 90,0 (nº/h) e em NREM foi de 55,6 (nº/h). Permaneceu 21,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**61,8 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**67%**);
3. Aumento da latência para o início do sono (**79,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**186,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**61,5 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares (**28,2 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**4,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**68,4 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (**10,6 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM (**16,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco intenso, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.



Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	MILTON KAWAKAMI
ID:	0
Altura:	1,76 m
Peso:	96 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	29-11-1975
IMC:	30,99

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	21:42:09
Data do Exame:	15-09-2025
Médico Solicitante:	DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	15/09/2025 21:42
Data/Horário de Término:	16/09/2025 05:43
Tempo Total de Registro (TTR):	481,0
Tempo Total de Sono (TTS):	296,0
Latência para o início do sono:	79,0
Latência para o sono REM:	186,5
Tempo acordado após o adormecer:	106,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	61,5 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	14,0	202,5	31,5	48,0	185,0
% de TTS	4,7	68,4	10,6	16,2	38,5

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total despertares de	226	28,2

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	89,8	110
NREM	88,5	113
Vigília	101,1	125

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	“RERA”	A + H + “RERA”
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	6	0	6	299	305	0	305
Índice	0,0	1,2	0,0	1,2	60,6	61,8	0,0	61,8
Índice em REM	0,0	2,5	0,0	2,5	88,8	91,3	0,0	91,3
Índice em NREM	0,0	1,0	0,0	1,0	55,2	56,1	0,0	56,1
Duração máx (seg)	0	17,1	0	17,1	29,1	29,1	0	29,1
Duração média (seg)	0	12,8	0	12,8	16,2	14,5	0	14,5
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 61,8 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + “RERA”): 61,8 (nº/h)


DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	90%	67%
NREM:	91%	77%
REM:	83%	67%
Vigília:	93%	79%


Valor de oximetria predominante durante o sono: 92%

Total de dessaturações: 302

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	61,5 %	≥85%
Latência para o início do sono	79,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	186,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	4,7 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	68,4 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	10,6 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	16,2 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	38,5 %	5%
Índice de despertares	28,2 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	61,8 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h