

Exame

Nome	Clodomir Silva Marçal	Nascimento	11/04/1988 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	20/04/2026 – 23:03:14	Tempo total	09:14:50 (554,8 min)		
Fim	21/04/2026 – 08:18:04	Tempo válido	08:56:40 (536,7 min)		

Condições na noite do exame


- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado


Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}




Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%




Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular



Risco de FA^{5,6,7}



Intensidade do ronco registrado




Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 20/04/2026, iniciado às 23:03 e terminado às 08:18. O tempo total de registro foi de 9h14min (554 minutos) e o tempo válido foi de 8h56min (536 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 9 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 1,0/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 97% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 9% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 1,0/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Foram detectados eventos de ronco durante 9% do tempo de registro.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame

Nome	Clodomir Silva Marçal	Nascimento	11/04/1988 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	20/04/2026 - 23:03:14	Tempo total	09:14:50 (554,8 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 18/04/2026

Peso 114 kg
Altura 1,62 m
IMC 43,4

Medicamentos

Respondido em 18/04/2026

☐ Nenhum
☒ valsartana 160 mg anlodip

Sintomas Respondido em 18/04/2026


☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☐ Sono não reparador
☐ Despertares frequentes
☐ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 18/04/2026

☐ Nenhuma
☒ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☐ Dislipidemia
☐ Câncer
☐ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%)




SpO ₂ mínima	92%
SpO ₂ média	97%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações ¹	9
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	1,0 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	0,9 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	2,0 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	555,0 min
Tempo com ronco total	50,0 min (9%)
Tempo com ronco baixo	44,4 min (8%)
Tempo com ronco médio	5,6 min (1%)
Tempo com ronco alto	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	42 bpm
Média	59 bpm
Máxima	114 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	0
Tempo total em FA	-
Episódio de menor duração	-
Episódio de maior duração	-
Duração média dos episódios	-
Risco de FA	Baixo

Sono estimado

Tempo total de sono	483,0 min
Tempo para dormir	13,0 min
Tempo acordado pós-sono	58,5 min
Eficiência do sono	87%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Clodomir Silva Marçal	Nascimento	11/04/1988 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	20/04/2026 - 23:03:14	Tempo total	09:14:50 (554,8 min)		

Polissonogramas

