

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: LAERCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 18-02-2026

Idade: 68 anos

Peso: 85 kg

Altura: 1,66 m

Médico Solicitante: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 18/02/2026 21:57 e finalizado às 19/02/2026 05:45.

A latência para início do sono foi de **29,0** min e a latência para o sono REM de **225,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 153,5 min, com eficiência do sono de **33,0** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **5,2** % de estágio N1, **61,6** % de estágio N2, **18,2** % de estágio N3 e **15,0** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 282,5 min. Ocorreram 40 despertares, sendo o índice de **5,2 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 45, sendo 1 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 44 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **17,6 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 20,9 e o IDR durante o sono NREM foi de 17,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 17,6 (nº/h), sendo 0,4 apneia/h e 17,2 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 94% e a mínima de 87%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 5,8 (nº/h), sendo que em REM foi de 20,9 (nº/h) e em NREM foi de 17,0 (nº/h). Permaneceu 0,5 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (**17,6 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**87%**);
3. Latência para o início do sono normal (**29,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**225,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**33,0** %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (**5,2 nº/h**) (VN= até 15 nº/h);
7. Ligeiro aumento do percentual do estágio N1 (**5,2** %) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**61,6** %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**18,2** %) (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM (**15,0** %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9 cmH₂O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	LAERCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ID:	0
Altura:	1,66 m
Peso:	85 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	11-9-1957
IMC:	30,85

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	21:57:23
Data do Exame:	18-02-2026
Médico Solicitante:	DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	18/02/2026 21:57
Data/Horário de Término:	19/02/2026 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	465,0
Tempo Total de Sono (TTS):	153,5
Latência para o início do sono:	29,0
Latência para o sono REM:	225,5
Tempo acordado após o adormecer:	282,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	33,0 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	8,0	94,5	28,0	23,0	311,5
% de TTS	5,2	61,6	18,2	15,0	67,0

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	40	5,2

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	59,7	79
NREM	64,6	88
Vigília	63,9	90

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	1	0	1	44	45	0	45
Índice	0,0	0,4	0,0	0,4	17,2	17,6	0,0	17,6
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9	0,0	20,9
Índice em NREM	0,0	0,5	0,0	0,5	16,6	17,0	0,0	17,0
Duração máx (seg)	0	21,3	0	21,3	31,0	31,0	0	31,0
Duração média (seg)	0	21,3	0	21,3	21,2	21,2	0	21,2
Índice em Supino	0	0	0	0	15,1	15,1	0	15,1
Índice em Não Supino	0,0	0,6	0,0	0,6	16,0	16,6	0,0	16,6

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 17,6 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 17,6 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	87%
NREM:	94%	87%
REM:	95%	91%
Vigília:	96%	85%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%


Total de dessaturações: 45


"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	3	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	0	0	0	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	1	0	2	0
DIREITO	0	0	0	3	0
ESQUERDO	0	0	0	3	0
SUPINO	0	0	0	14	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	33,0 %	≥85%
Latência para o início do sono	29,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	225,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	5,2 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	61,6 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	18,2 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	15,0 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	67,0 %	5%
Índice de despertares	5,2 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	17,6 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h