

Relatório De Polissonografia De Noite Inteira

Dados do paciente:			Data: 04/10/2022
Nome:	Gustavo Estevam	Equipamento:	APNEALINK
Médico Interpretador: Dra. DENISE L. ALVARENGA CRM: 98997			

Detalhes do dispositivo e do sensor

O estudo foi registrado de forma domiciliar em um dispositivo Apneia Link usando 1 cinta de esforço, um sensor de fluxo respiratório baseado em pressão e um oxímetro. A frequência cardíaca é obtida a partir do sensor de oxímetro.

O exame foi iniciado às 01:16 horas e finalizado às 05:45 com duração de 4 h:29 min

O número total de eventos respiratórios foi de **622**, sendo **37** apneias, **245** hipopneias. O **índice de apneias/hipopneias** (IAH) foi de **66.4** (nº/h), sendo **8.7** apneias obstrutivas, **0** apneias centrais, **0** apneias mistas e **57.7** hipopneias/h.

A permanência das posições registradas do paciente durante o tempo total de registro foram: Supina **99.5** %, não supina **0.5** % e em pé **0** %. Eventos respiratórios predominante na posição supina.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 94 %, a **média** 92 % e a **mínima** de 82 %. O **Índice de Dessaturação** foi de **82.2** e permaneceu **16** % do período analisado com SpO₂ abaixo ou igual a 90 %.

A frequência cardíaca durante o registro de PSG variou de **41 (BPM)** a **111 (BPM)**, com média de **65 (BPM)**.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

IAH (Índice de Apneia e Hipopneia) = Apneias + Hipopneias

Conclusão:

1. Índice de apneia/hipopneia está acentuadamente elevado (IAH = 66,4 eventos/hora), com predomínio de hipopneias, associadas com a queda da oxihemoglobina em sua maioria na posição supina.
2. Dessaturação da oxihemoglobina durante o exame, com SpO₂ média de 92%, permanecendo 16% do período analisado abaixo de 90%.
3. Apresentou Ronco registrado durante o exame.
4. Frequência Cardíaca média durante o tempo de registro dentro da normalidade.
5. Exame apresentou índice de apneia/hipopneia considerado acentuadamente elevado durante esta noite, a hipótese de Síndrome da Apneia obstrutiva do sono deve ser avaliada com a associação clínica do paciente.

DENISE
LANZONI DE
ALVARENGA:209
90180816

Assinado de forma digital
por DENISE LANZONI DE
ALVARENGA:20990180816
Dados: 2022.10.05
11:02:51 -03'00'

Relatório de diagnóstico


Detalhes da gravação				04/10/2022
Dispositivo	ApneaLink Air			Tipo: III
Gravação	Início: 1:16am	Fim: 5:45am	Duração - h:	4:29
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 1:28am	Fim: 5:43am	Duração - h:	4:14
Avaliação saturação O2	Início: 1:26am	Fim: 5:45am	Duração - h:	4:18

Estatísticas			
			
Índice de eventos	IER (IAH): 68.4	IA: 8.7	IH: 57.7
Supina	Tempo - h: 4:13	Porcentagem: 99.5	
	IER (IAH): 68.8	IA: 8.8	IH: 58.0
Não-supina	Tempo - h: 0:01	Porcentagem: 0.5	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Em pé	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0.0	
	IER (IAH): 0.0	IA: 0.0	IH: 0.0
Eventos totais	Apneias: 37	Hipopneias: 245	
Índice de apneia Obstrutiva:	8.7	Central: 0.0	Mista: 0.0
			Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00	Porcentagem: 0	
Desaturação de oxigênio	IOI: 82.2	Total: 355	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 94	Média: 92	Mais baixo: 82
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 18	Sat. <=85%: 1	Sat. <=80%: 0
		Sat. <=88%: 6	Tempo<=88%-h: 0:14
Respirações	Total: 2300	Média/minuto: 9.0	Ronco: 1540
Pulso - bpm	Mín.: 41	Média: 65	Máx.: 111

Orient. análise: **AASM 2012, Classificação manual**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[8,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Desaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos





10 DICAS PARA UM SONO DE QUALIDADE

- 1 – Estabeleça um horário regular para dormir e acordar;
- 2 – Se você tem o hábito de cochilar após o almoço, não exceda 45 minutos;
- 3 – Evite ingerir bebidas alcoólicas 4 horas antes do horário de dormir e também não fume nesse período;
- 4 – Evite ingerir bebidas com cafeína (café, chá preto, refrigerantes de cola, chocolate) nas 6 horas antes do horário de dormir;
- 5- Evite refeições pesadas, excessivamente picantes ou adocicadas 4 horas antes do horário de dormir;
- 6 – Faça exercícios físicos regularmente (mas não próximo do horário de dormir) e se possível pegando o sol da manhã;
- 7- Durma em uma cama confortável para você, e evite levar trabalho ou fazer refeições nela. A cama deve ser limpa e com cobertas adequadas a temperatura ambiente;
- 8 – Encontre uma temperatura ambiente confortável para o sono e mantenha o quarto bem ventilado;
- 9 – Elimine todos os ruídos do quarto e mantenha o quarto mais escuro possível;
- 10 – Evite equipamentos eletrônicos (computador, telefone celular, televisão) uma hora antes do seu horário de dormir;

DORMIR BEM, FAZ BEM – VALORIZA O SEU SONO