

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: JOSÉ RUBENS DE SOUZA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 14-03-2026

Idade: 57 anos

Peso: 71 kg

Altura: 1,75 m

Médico Solicitante: DRA.CAROLINA RUSTON

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 14/03/2026 22:19 e finalizado às 15/03/2026 05:43.

A latência para início do sono foi de **57,5 min** e a latência para o sono REM de **22,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 234,0 min, com eficiência do sono de **52,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **7,7 %** de estágio N1, **54,1 %** de estágio N2, **18,8 %** de estágio N3 e **19,4 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 153,3 min. Ocorreram 34 despertares, sendo o índice de **4,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 149, sendo 40 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 109 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **38,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 52,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 34,7. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 38,2 (nº/h), sendo 10,3 apneia/h e 27,9 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 94%, a **média** de 94% e a **mínima** de 85%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 17,1 (nº/h), sendo que em REM foi de 54,1 (nº/h) e em NREM foi de 26,4 (nº/h). Permaneceu 1,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (05), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**38,2 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**85%**);
3. Latência para o início do sono (**57,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**22,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**52,6 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **4,6 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**7,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**54,1 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**18,8 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**19,4 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: JOSÉ RUBENS DE SOUZA

Data do Exame: 14-03-2026

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	JOSÉ RUBENS DE SOUZA
ID:	0
Altura:	1,75 m
Peso:	71 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	3-5-1968
IMC:	23,18

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	22:19:11
Data do Exame:	14-03-2026
Médico Solicitante:	DRA.CAROLINA RUSTON

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	14/03/2026 22:19
Data/Horário de Término:	15/03/2026 05:43
Tempo Total de Registro (TTR):	444,8
Tempo Total de Sono (TTS):	234,0
Latência para o início do sono:	57,5
Latência para o sono REM:	22,5
Tempo acordado após o adormecer:	153,3
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	52,6 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	18,0	126,5	44,0	45,5	211,0
% de TTS	7,7	54,1	18,8	19,4	47,4

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	34	4,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	64,2	84
NREM	63,0	82
Vigília	68,0	88

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	40	0	40	109	149	0	149
Índice	0,0	10,3	0,0	10,3	27,9	38,2	0,0	38,2
Índice em REM	0,0	5,3	0,0	5,3	47,5	52,7	0,0	52,7
Índice em NREM	0,0	11,5	0,0	11,5	23,2	34,7	0,0	34,7
Duração máx (seg)	0	71,2	0	71,2	64,8	71,2	0	71,2
Duração média (seg)	0	28,8	0	28,8	29,2	29,0	0	29,0
Índice em Supino	0	10,3	0	10,3	28,0	38,2	0	38,2
Índice em Não Supino	0	0	0	0	0	0	0	0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 38,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 38,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	85%
NREM:	94%	88%
REM:	93%	85%
Vigília:	94%	88%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%


Total de dessaturações: 127


“PLMS” (Periodic limb movements in sleep)		
Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
“PLMS”	0	0,0
“PLMS” associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	4	0	36	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	36	0	73	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	52,6 %	≥85%
Latência para o início do sono	57,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	22,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	7,7 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	54,1 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	18,8 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	19,4 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	47,4 %	5%
Índice de despertares	4,6 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	38,2 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h