

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: ADEMIR IZIDOURO DA SILVA

Data do Exame: 02-03-2026

Peso: 58 kg

Médico Solicitante: DR PEDRO MACEDO

Sexo: Masculino

Idade: 77 anos

Altura: 1,60 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 02/03/2026 22:01 e finalizado às 03/03/2026 05:41.

A latência para início do sono foi de **6,0 min** e a latência para o sono REM de **85,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 355,5 min, com eficiência do sono de **77,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,9 %** de estágio N1, **65,7 %** de estágio N2, **15,2 %** de estágio N3 e **15,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 98,5 min. Ocorreram 36 despertares, sendo o índice de **4,7 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 354, sendo 28 apneias obstrutivas, 1 apneias centrais, 0 apneias mistas, 325 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **59,7 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 67,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 58,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 59,7 (nº/h), sendo 4,9 apneia/h e 54,9 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 90% e a mínima de 83%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 42,0 (nº/h), sendo que em REM foi de 54,4 (nº/h) e em NREM foi de 54,1 (nº/h). Permaneceu 28,6 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**59,7 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**83%**);
3. Latência para o início do sono (**6,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**85,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**77,3 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **4,7 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**3,9 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**65,7 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**15,2 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**15,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

Presença de bruxismo ou apertamento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: ADEMIR IZIDOURO DA SILVA
ID: 0
Altura: 1,60 m
Peso: 58 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 17-12-1948
IMC: 22,66

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:01:46
Data do Exame: 02-03-2026
Médico Solicitante: DR PEDRO MACEDO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	02/03/2026 22:01
Data/Horário de Término:	03/03/2026 05:41
Tempo Total de Registro (TTR):	460,0
Tempo Total de Sono (TTS):	355,5
Latência para o início do sono:	6,0
Latência para o sono REM:	85,0
Tempo acordado após o adormecer:	98,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	77,3 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	14,0	233,5	54,0	54,0	104,5
% de TTS	3,9	65,7	15,2	15,2	22,7

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	36		4,7

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	58,6	83
NREM	54,4	71
Vigília	57,4	83

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Índice	1	28	0	29	325	354	0	354
Índice em REM	0,2	4,7	0,0	4,9	54,9	59,7	0,0	59,7
Índice em NREM	0,0	6,7	0,0	6,7	61,1	67,8	0,0	67,8
Índice em Vigília	0,2	4,4	0,0	4,6	53,7	58,3	0,0	58,3
Duração máx (seg)	16,9	40,5	0	40,5	56,1	56,1	0	56,1
Duração média (seg)	16,9	16,8	0	16,8	20,3	18,0	0	18,0
Índice em Supino	0,2	4,7	0	4,9	54,9	59,7	0	59,7
Índice em Lateral	0	0	0	0	0	0	0	0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 59,7 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 59,7 (nº/h)