

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: ANDRESSA MICHAELLE RIBEIRO ZORDAN

Sexo: Feminino

Data do Exame: 26-03-2026

Idade: 34 anos

Peso: 74 kg

Altura: 1,62 m

Médico Solicitante: LUCIANA MARÇAL

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 26/03/2026 22:02 e finalizado às 27/03/2026 05:47.

A latência para início do sono foi de **28,5 min** e a latência para o sono REM de **223,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 431,0 min, com eficiência do sono de **92,8 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,7 %** de estágio N1, **91,8 %** de estágio N2, **2,7 %** de estágio N3 e **3,8 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 5,0 min. Ocorreram 381 despertares, sendo o índice de **49,2 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 357, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 357 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **49,7 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 58,2 e o IDR durante o sono NREM foi de 49,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 49,7 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 49,7 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal** foi 97%, a **média** de 96% e a **mínima** de 78%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 57,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 76,4 (nº/h) e em NREM foi de 61,5 (nº/h). Permaneceu 0,1 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**49,7 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**78%**);
3. Latência para o início do sono (**28,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**223,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**92,8 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **49,2 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**1,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**91,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**2,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**3,8 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: ANDRESSA MICHAELLE RIBEIRO ZORDAN

Data do Exame: 26-03-2026

DADOS DO PACIENTE:

Nome: ANDRESSA MICHAELLE RIBEIRO ZORDAN

ID: 0

Altura: 1,62 m

Peso: 74 kg

Sexo: Feminino

Data de Nascimento: 5-12-1991

IMC: 28,20

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:02:02

Data do Exame: 26-03-2026

Médico Solicitante: LUCIANA MARÇAL

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	26/03/2026 22:02
Data/Horário de Término:	27/03/2026 05:47
Tempo Total de Registro (TTR):	464,4
Tempo Total de Sono (TTS):	431,0
Latência para o início do sono:	28,5
Latência para o sono REM:	223,0
Tempo acordado após o adormecer:	5,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	92,8 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	7,5	395,5	11,5	16,5	33,5
% de TTS	1,7	91,8	2,7	3,8	7,2

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	381	49,2

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	98,7	110
NREM	97,4	113
Vigília	94,8	107

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	357	357	0	357
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	0,0	49,7
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	0,0	58,2
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4	0,0	49,4
Duração máx (seg)	0	0	0	0	42,9	42,9	0	42,9
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	20,3	20,3	0	20,3
Índice em Supino	0	0	0	0	55,9	55,9	0	55,9
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	0,0	47,5

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 49,7 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 49,7 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	96%	78%
NREM:	96%	78%
REM:	97%	90%
Vigília:	97%	90%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 98%


Total de dessaturações: 447


"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	3	0
SUPINO	0	0	0	13	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	36	0
DIREITO	0	0	0	78	0
ESQUERDO	0	0	0	73	0
SUPINO	0	0	0	92	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	92,8 %	≥85%
Latência para o início do sono	28,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	223,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	1,7 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	91,8 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	2,7 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	3,8 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	7,2 %	5%
Índice de despertares	49,2 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	49,7 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h