

Exame

Nome	Aline Fernanda Dias Mioni	Nascimento	23/10/1987 (37 anos)	Sexo	Feminino
Início	24/09/2025 – 23:00:54	Tempo total	07:51:00 (471,0 min)		
Fim	25/09/2025 – 06:51:54	Tempo válido	07:39:21 (459,4 min)		

Condições na noite do exame


- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado


Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%



Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

14 %min/hora

0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}

Baixo

Alto

Intensidade do ronco registrado

Silêncio
99 %

Baixo
1 %

Médio
0 %


Alto
0 %

Exame de polissonografia realizado no dia 24/09/2025, iniciado às 23:00 e terminado às 06:51. O tempo total de registro foi de 7h51min (471 minutos) e o tempo válido foi de 7h39min (459 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 10 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 1,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 96% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 1% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 1,3/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame

Nome	Aline Fernanda Dias Mioni	Nascimento	23/10/1987 (37 anos)	Sexo	Feminino
Início	24/09/2025 - 23:00:54	Tempo total	07:51:00 (471,0 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 24/09/2025

Peso	85 kg
Altura	1,67 m
IMC	30,5

Medicamentos

Respondido em 24/09/2025

- ☐ Nenhum
☒ Setralina

Sintomas Respondido em 24/09/2025


- ☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☒ Sonolência excessiva diurna
☒ Sono não reparador
☒ Despertares frequentes
☒ Engasgos noturnos
☒ Refluxo gastroesofágico
☐ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 24/09/2025

- ☐ Nenhuma
☒ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☐ Dislipidemia
☐ Câncer
☒ Depressão
☒ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☒ Angina
☒ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%)




SpO ₂ mínima	92%
SpO ₂ média	96%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações ¹	10
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	1,3 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	0,5 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	13,6 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	469,0 min
Tempo com ronco total	4,7 min (1%)
Tempo com ronco baixo	4,7 min (1%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	54 bpm
Média	69 bpm
Máxima	117 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	0
Tempo total em FA	-
Episódio de menor duração	-
Episódio de maior duração	-
Duração média dos episódios	-
Risco de FA	Baixo

Sono estimado

Tempo total de sono	344,0 min
Tempo para dormir	39,0 min
Tempo acordado pós-sono	85,5 min
Eficiência do sono	73%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Aline Fernanda Dias Mioni	Nascimento	23/10/1987 (37 anos)	Sexo	Feminino
Início	24/09/2025 - 23:00:54	Tempo total	07:51:00 (471,0 min)		

Polissonogramas

