

Exame

Nome	Antonio Ricardo Silveira Ferreira	Nascimento	08/12/1986 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	13/07/2025 - 01:47:37	Tempo total	08:09:04 (489,1 min)		
Fim	13/07/2025 - 09:56:41	Tempo válido	06:23:04 (383,1 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 11/07/2025

Peso 106 kg
Altura 1,89 m
IMC 29,7

Medicamentos

Não respondido

- ☐ Nenhum


Sintomas Respondido em 11/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 11/07/2025

- ☒ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 13/07/2025, iniciado às 01:47 e terminado às 09:56. O tempo total de registro foi de 8h09min (489 minutos) e o tempo válido foi de 6h23min (383 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 256 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 40,1/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 91% e permaneceu abaixo de 90% durante 21% do tempo de registro (81 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 34% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 40,1/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Exame


Nome	Antonio Ricardo Silveira Ferreira	Nascimento	08/12/1986 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	13/07/2025 - 01:47:37	Tempo total	08:09:04 (489,1 min)		

Oximetria (SpO₂)



SpO ₂ mínima	71%
SpO ₂ média	91%
SpO ₂ máxima	99%
Tempo com SpO ₂ < 90%	81,9 min (21%)
Número de dessaturações ¹	256
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	40,1 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	39,3 /hora
Número de eventos de hipoxemia ³	1
Tempo total em hipoxemia ³	5,5 min (1%)

Frequência cardíaca




Mínima	51 bpm
Média	69 bpm
Máxima	121 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	417,5 min
Tempo para dormir	22,0 min
Tempo acordado pós-sono	47,5 min
Eficiência do sono	85%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ **189,6 %min /hora**



Análise de ronco

Tempo de gravação	488,0 min
Tempo com ronco	165,9 min (34%)



Polissonogramas

