

06/10
10:30

medun: WD8738582654A
Unid: H36904 902 C699

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J366 844 169 A49

BRUNO TELLES SPOSITO GONÇALVES

IDADE: 43	PESO: 90	ALTURA: 172	PROFISSÃO: Corretor
SINTOMAS: Refluxo gástrico / Boca seca /			
QUEIXAS: Ronco - acordar tossindo			
MEDICAMENTOS: Bupi - Geifage (1cp)			
MÉDICO: Dr. Américo / Dr. Louro Ranta			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 3x4x			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: 12 LANCHE: 15.30 JANTAR: 21.00			
HORA QUE DORME: 23		HORA QUE ACORDA: 8:30	
COCHILHO () SIM ☒ NÃO		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO			
FUMO ☒ SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 12 por dia			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 40 cm	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 92,2	SPO2: 79%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: alergia a gato		IAH: 28.3 c/ev	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA		c/ P = 9 cm H ₂ O.	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
20/06 Avaliação			
24			
27/06 P = 7.7 cm H ₂ O			
24 IAH = 2.5 e/ev			
m. de uso: 8h49'			
Bem adaptada, teve resfriado leve			
15/07 P = 7.8 cm H ₂ O			
24 IAH = 5.9 e/ev			
m. de uso: 4h36'			
não tem colocado após a ida ao banheiro			
29/07 P = 7.8 cm H ₂ O			
24 IAH = 3.5 e/ev			
m. de uso: 7h36'			
Bem adaptado. fua			
30/09 P = 7.7 cm H ₂ O			
2024 IAH = 5.9 e/ev → não tá usando.			
m. de uso: 2h28 min. silvia			

29/10/24 $P = 7,1 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 7,0 \text{ elh}$
 mde uso: 2h30'

não utiliza quando
 viaja e relato que
 em casa o posicionamento
 da traqueia não está
 correta
 Natália

20/01/25 $P_{\text{media}}: 7,1 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 7 \text{ elh}$
 mde uso: 6h49'

de 30 dias utiliza 16 dias
 - Não utiliza ao viajar ou
 dormir fora de casa;
 - dias nesses de 4 h não
 consegue viver plado
 que gosta de dormir
 - Oxiúto trocado filtro

24/03 } $P = 7,1 \text{ elh}$ $P_{90\%} = 8,0 \text{ elh}$
 20/25 } $IAH = 4,4 \text{ elh}$
 } mde uso = 7h30min.
 } fuga = 2min.

sente melhora dispnica.

Natália

Auto: 6 a 8 cm H₂O

26/05/25 $P = 7,8 \text{ cm H}_2\text{O}$ $P_{90\%} = 8,0 \text{ elh}$
 $IAH = 2,1 \text{ elh}$
 mde uso = 8h17min.
 fuga = 1min.

AP: 6 a 9 cm
 $P_{\text{unidade}} = 3$
 máscara triangular
 nariz

25/07/25 $P = 7,9 \text{ cm H}_2\text{O}$ $P_{\text{unidade}} = 9,0 \text{ elh}$
 $IAH = 1,3 \text{ elh}$
 mde uso = 8h40min.
 fuga = 24min

d fuga; oxiúto ajuste máscara silica.

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Bruno Telles Sposito Gonçalves

EXAME nº: 5334-2

SOLICITADO POR: Dr. Américo Fernando dos Santos Gonçalves

DATA: 18/03/2024

IDADE: 43 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h54min e concluído às 06h15min. A latência para o sono foi de 16 minutos e a latência para o estágio REM, de 89 minutos. O tempo total de sono foi de 450,5 minutos (07h30min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,6%. A distribuição do sono mostrou 10,1% de estágio 1, 67,6% de estágio 2, 5,3% de estágio 3 e 17% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 30,5 minutos em vigília, ocorreram 119 microdespertares (índice: 15,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 19,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 92,2/hora, sendo 28,6 apneia/hora e 63,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 92,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 90%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 79%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (92,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (92,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 50; máxima: 88 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 16 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (89min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono (90,6%; normal: 85% ou acima) permanecer no limite da normalidade, o sono foi fragmentado microdespertares (índice: 15,8/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 2 (67,6%; normal: 45-55%) e a redução dos estágios 3 (5,3%; normal: 10-12%) e REM (17%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 1 (10,1%; normal: 8-10%) permaneceu no limite superior da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (19,8/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 0 (normal até 9; máxima: 24).



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Bruno Telles Sposito Gonçalves

EXAME nº: 5334-3 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Américo Fernando dos Santos Gonçalves

DATA: 17/06/2024

IDADE: 43 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 22h13min e concluído às 04h13min. A latência para o sono foi de 16 minutos e a latência para o estágio REM, de 109 minutos. O tempo total de sono foi de 299,5 minutos (04h59min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 83,1%. A distribuição do sono mostrou 19,7% de estágio 1, 51,6% de estágio 2, 12% de estágio 3 e 16,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 45 minutos em vigília, ocorreram 207 microdespertares (índice: 41,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 28,3/hora, sendo 1,2 apneia/hora e 27,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 28,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 79%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa média (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 9 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (28,3/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (28,3/hora), ritmo cardíaco sinusal, despertares e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente no primeiro terço do exame. As frequências cardíacas foram: mínima: 66; máxima: 96 bpm. Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 16 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h10min. A latência para o estágio REM estava normal (109 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 83,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 41,5/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (19,7%; normal: 8-10%) e a redução do estágio REM (16,7%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 2 (51,6%; normal: 45-55%) e 3 (12%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Ps: colocada "queixosa" às 22:58h

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez

CRM 69.730