

R. 07/11/25

JOAO BARANOV FILHO	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	IAH = 93/L
OXIMETRIA:	
01	P = 7.0 4 P = 7.6 início = 5.0
11	IAH = 4.5
21	m. de uso: 6hr — sua claudicação
17	P = 7.6 cmH ₂ O Fuga = 20.8
11	IAH = 5.3/ev
21	m. de uso: 6hr
	Relata algo no ombro D uso na dificuldade e sua
12/12	P = 7.6 cmH ₂ O
21	IAH = 4.0
	m. de uso: 6h30' sua
16/02	P = 7.6 cmH ₂ O
22	IAH = 1.7
	m. de uso: 6hr sua
16/01	P = 7.6 cmH ₂ O
24	Coloco masc. nas oronasal (L) ywell ele esta fazendo arutmia
30/01	P = 8.0 cmH ₂ O ↑ a umidif.
24	IAH = 25.6 elev
	m. de uso = 6hr sua.
20/03	P = 8.0 cmH ₂ O 4 masc. oronasal (L)
24	IAH = 27.8 elev
	m. de uso: 5h36' sua

20/02
24 P = 8 cm H₂O
IAH = 26,5
m. de uso: 6 hr
Orientado adaptar
melhor a máscara
p/ ↓ fuga
Natasha

09/05/24 P = 8 cm H₂O
IAH = 1,5 e/h
m. de uso: 6 h 23 m
fuga: 18,7 l/min
melhora a
fuga c/ a máscara
nasal
Troca filtro
Natasha

27/06
24 P = 8 cm H₂O
IAH = 2,4 e/h
m. de uso: 6 h 47'
fuga: 29,6 l/min
Revisa Viagem e não
utilizou CPAP por
um período
notado

28/08
24 P = 8 cm H₂O
IAH = 1,4 e/h
m. de uso: 6 h 4'
Fuga = 22,7
Viagem não levou
fua

27/11
24 P = 8 cm H₂O
IAH = 2,3
m. de uso: 6 hr
fua

19/02
25 P = 8 cm H₂O (30d - 28 A de 4 hr)
IAH = 5,4 e/h
m. de uso: 6 hr
fuga = 29,4 lpm.
fua Cláudia

14/05
25 P = 8 cm H₂O
IAH = 3,3 e/h
m. de uso: 5 h 43'
fuga = 28,3
fua Cláudia

30/07
25 P = 8 cm H₂O
IAH = 1,8 e/h
m. de uso: 5 hr
fuga = 26 lpm.
Relata que estava

HD:
MEDICO:
MEDICAMENT
IMC
CIRCUNF
PA:
OXIMETRI

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: João Baranov Filho
EXAME nº: 3978-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 18/02/2019
IDADE: 73 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h24min e concluído às 06h06min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 47 minutos. O tempo total de sono foi de 315,5 minutos (05h15min), com eficiência de sono (T T S / T T R)* de 79,6%. A distribuição do sono mostrou 20,1% de estágio 1, 51,5% de estágio 2, 1,9% de estágio 3 e 26,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 67 minutos em vigília, ocorreram 93 microdespertares (índice: 17,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 32,3/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 9,3/hora, sendo 1,9 apneia/hora e 7,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 9,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 90% e a mínima de 77%.

(*) T T S $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono T T R $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP, modo manual, sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®). A pressão final do CPAP foi de 6,5 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (9,3/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (9,3/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 43; máxima: 56 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (47 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 79,6%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 17,7/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (20,1%; normal: 8-10%) e REM (26,5%; normal: 20%), e a redução do estágio 3 (1,9%; normal: 10-12%). A porcentagem do estágio 2 (51,5%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento moderado do índice de movimentos periódicos de membros (índice: 32,3/hora; índice normal moderado: 25 a 50/hora).