

modem: WD87372427214
CPAP: J36692167BFAB

Unid. #3692499024
1B

HD:	
MEDICO:	VERA LUCIA COSTA E SILVA
MEDICAMENTOS:	APNEIA DO SONO
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

06 P=10
04 m. de uso 5h43'
22 IAH=0.3

IAH=0.0 fuga 72

aparelho n esta funcionando.
Unid. #3692499024

07 P=10 cmH₂O
06 IAH=0.1 elw
24 fuga=25.7 lpm.

fuga

06/06 P=6.5 cmH₂O
2025 P90: 7.4 cmH₂O
IAH=1.0 elw

Auto 5 a 12 ↓ 5 a 8 cmH₂O Philips

m uso= 6h13 min
fuga= 2xg.

* fuso filtro *
↑ lpm: 4
unidade: 5
Silva

Delete

1/5

Nome: VERA LUCIA COSTA E SILVA			
Sexo: F		Idade: 72 anos	
IMC: 29.69		Data do Exame: 12/07/2024	
		Peso: 65 Kg	Altura: 150,00 m
		Exame: 13597_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:03:10 horas e encerrado às 06:02:45 horas, com latência para o sono de 0 minutos e latência para o sono REM de 44 minutos. O tempo total de sono foi de 410,5 minutos, com eficiência do sono de 85,5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,3%	Até 5%
Estágio 2	46,0%	45 - 55%
Estágio 3	31,2%	> 15%
Sono REM	21,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	85,5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 69,5 minutos ocorreram **230 despertares** (índice de **33,6 /hora**).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 78 bpm, a maior de 95 bpm e a menor de 68 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**, e **0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 263 eventos respiratórios, sendo 0 central e 263 obstrutivos. Sendo 144 apnéias, 119 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 36,4/hora**, sendo 21,1 apnéia/hora e 17,4 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 22,2 e a duração máxima de 63,5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 45,7/hora, sendo 2,7 apnéia/hora e 43,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **98%**, sendo a **saturação média de 94%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 82%**, permanecendo 20,4 minutos (4,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 254 dessaturações. Índice de dessaturações: 37,1/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 35,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 38,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

LAUDO DA POLISSONOGRAMA



Dr Alberto Jorge Remesar Lopez CRM: 69730
Especialista em Medicina do Sono - Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP

NOME: Vera Lúcia Costa e Silva

EXAME nº: 1170-3 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 01/08/2011

IDADE: 59anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h07min e concluído às 06h15min. A latência para o sono foi de 11,5 minutos e a latência para o sono REM, de 64 minutos. O tempo total de sono foi de 371 minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87%. A distribuição do sono mostrou 7,1% de estágio 1, 23,9% de estágio 2, 42,7% de estágio 3 e 26,3% de sono REM. No período total de sono permaneceu 57 minutos em vigília, ocorreram 159 microdespertares (Índice: 25,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 1/hora, sendo 0,5 apneia/hora e 0,5 hipopneia/hora. O número total de eventos respiratórios foi de 6, sendo 0 misto, 3 obstrutivos e 3 centrais. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, a média de 91% e a mínima de 85%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu ao CTD SONO para a adaptação ao aparelho auto CPAP II Amer (Resmed®), sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 2954F). A máscara utilizada foi a Swift II small (Resmed®). A pressão do auto CPAP recomendada foi de 11,2 cm de H₂O.

O índice de apneia/hipopneia (1/hora; normal até 4/hora) manteve-se nos limites da normalidade. Registraram-se algumas dessaturações da oxi-hemoglobina isoladas e durante a transição dos estágios 1-2, e episódios de redução do fluxo aéreo, que terminavam em despertares. Observaram-se extrassístoles ao longo do exame.

Ausência de ronco.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11,5 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava encurtada (64 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (87%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (159; 25,7/hora; normal até 9/hora) – observou-se a intrusão de ritmo alfa no estágio 3. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (42,7%; normal: 10-12%) e do sono REM (26,3%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (23,9%; normal: 45-55%). A porcentagem do estágio 1, ou estágio superficial do sono (7,1%; normal: 5-8%), manteve-se nos limites da normalidade.

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 13 (sonolência diurna; normal até 10; máx: 24).

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730