

HD:	VERA LUCIA MAGALDI		
MEDICO:	APNEIA DO SONO		
MEDICAMENTOS:			
IMC			
CIRCUNF. DE PESCOÇO			
PA:			
OXIMETRIA:			

28/06 Adaptação do CPAP - 4 - 20 cmH₂O IAH = 34.4

25/10 P = 9.4 cmH₂O
 22 IAH = 0.7 e/w
 m. de uso: 5h 9'
 Bem adaptado, sem queixas.
 Oriento sobre o uso do aparelho

29/08 P = 9.4 cmH₂O
 23 IAH = 0.7 e/w TROCO O FILTRO
 m. de uso: 6h 32'

14/11 P = 8.9
 23 IAH = 0.8
 m. de uso: 6h 46' Ana.

13/08 P = 7.3 cmH₂O
 24 IAH = 0.9 e/w TROCO FILTRO
 m. de uso: 6h 40' Ana.

04/04 P = 8.4 cmH₂O
 25 IAH = 0.9 e/w NATACHA
 m. de uso = 6h 40' Ana

Sleep Study Report

Name of Patient: Vera Lucia Magaldi
Name of Referring Doctor: Dr Bruno Soares
Date of Study: 24/05/2019

Prezado Vera Lucia Magaldi,

Agradecemos por ter se submetido ao estudo do sono de noite inteira com o Watch-PAT. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 9 hrs, 4 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 8 hrs, 24 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI—apnea/hypopnea index) foi de 34,4. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 35,0. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 24,0. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 17,6% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, favor nos contatar.

Atenciosamente,

