

|                     |  |
|---------------------|--|
| ZENAUDE DALMAS DOI  |  |
| HD:                 |  |
| MEDICO:             |  |
| MEDICAMENTOS:       |  |
| IMC                 |  |
| CIRCUNF. DE PESCOÇO |  |
| PA:                 |  |
| OXIMETRIA:          |  |

10/09 Ajusto a pressão p/ 6 cmH<sub>2</sub>O  
 21 IAH = 7.8/2 Jua

08/10 P = 15.0 (6 cmH<sub>2</sub>O)  
 21 IAH = 3.6  
 Fuga = 15.0  
 M. Utilização: 8h44 Jua

10 P = 6 cmH<sub>2</sub>O  
 06 IAH = 2.9  
 22 Fuga = 12.0  
 M. de uso: 8h23' Jua



Nome: ZENAIDE DALMAS DOI  
Data de Nascimento: 1-4-1954  
MC: 25,71  
Sexo: Feminino  
Data do exame: 13-07-2021

Peso: 70 kg  
Altura: 1,65 m  
Medico: DR. FELIPE JORGE  
Medicamentos:  
Histórico:

### **Laudo de Polissonografia tipo "Split Night"**

Exame realizado na noite de 13-07-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 246,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,5 e 92,0 minutos. O tempo total de sono foi de 190,0, eficiência de 77,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 73,2%; estágio N3: 16,1%; sono REM: 8,4%. O índice de despertares foi de 12,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 37,3/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 116 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 81%, permanecendo 3,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 67 - 86 bpm e NREM de 65 - 88 bpm.


**CONCLUSÃO:** *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (04), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 37,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco moderado durante o sono.

**Exame polissonográfico Split-night evidenciando na primeira parte da noite apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.**

IAH: 05-15 /hora leve.  
IAH: 15-30 /hora moderada.  
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157



Paciente: ZENAIDE DALMAS DOI  
Data de Nascimento: 1-4-1954  
MC: 25,71  
Sexo: Feminino  
Data do exame: 13-07-2021

Peso: 70 kg  
Altura: 1,65 m  
Médico: DR. FELIPE JORGE  
Medicamentos:  
Histórico:

### Laudo de Polissonografia tipo "Split Night"

Exame realizado na noite de 13-07-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 272,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,0 e 144,0 minutos. O tempo total de sono foi de 222,5, eficiência de 81,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 42,5%; estágio N3: 28,8%; sono REM: 27,0%. O índice de despertares foi de 1,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 4,9/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 17 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 89%, permanecendo 0,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 78 bpm e NREM de 59 - 83 bpm.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (04), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM diminuída;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco moderado durante o sono.


**Exame polissonográfico Split-night, na segunda parte da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157