

CONSULTA

IDADE: _____ NS _____
 SINTOMAS: _____ PESO: _____ ZELIA MARIA BOLANHO
 QUEIXAS: _____ ALTURA: _____ PROFISSÃO: _____
 MEDICAMENTOS: _____
 MÉDICO: _____
 EXERCÍCIO FÍSICO: _____
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: _____ ALMOÇO: _____ LANCHE: _____ JANTAR: _____
 HORA QUE DORME: _____
 COCHILO () SIM () NÃO HORA QUE ACORDA: _____ DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO X NA SEMANA () NÃO
 FUMO () SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: _____
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: _____
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: _____ BANHEIRO: _____
 OVERLAP: _____ MALLAMPATI: _____ CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: _____
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: _____ IAH: _____ SPO2: _____
 CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: _____
 COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA
 () ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS
 02/01 P = 7cm H₂O
 23 IAH = 2.8
 m. de uso: 8h15'
 vazamento intenso

fla

Nome: ZELIA MARIA BOLANHO

Data de Nascimento: 8-5-1949

IMC: 34,02

Sexo: Feminino

Data do exame: 19-11-2023

Peso: 86 kg

Altura: 1,59 m

Médico: DRA. RAQUEL SILVEIRA JESUINO
E SILVA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-11-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 466,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 151,0 e 109,5 minutos. O tempo total de sono foi de 250,5 min, eficiência de 53,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,4%; estágio N2: 52,1%; estágio N3: 24,4%; sono REM: 22,2%. O índice de despertares foi de 16,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 47,7/hora, sendo 17 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 181 hipopnéias. A SpO2 média foi de 71% e a mínima de 51%, permanecendo 91,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 70 - 94 bpm e NREM de 68 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 47,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=51%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (22,5/hora);
8. registro de ronco durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157