



R: Major José dos Santos Moreira, 595 Centro Pindamonhangaba – SP
Tel (12) 3643-2044 – 36431889
www.institutodosonodovale.com.br

Descrição do Exame de Polissonografia POLISSONOGRAMA CPAP

Nome: **YOSHIE, KANO**

Sexo: **Feminino**

Peso: **43 kg**

Médico Solicitante: **SCAPUCCIN**

Idade: **78 anos**

Altura: **150 cm**

IMC: **19,11**

Data: **15-10-2018**

Comentários:

Exame realizado em Laboratório do Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno.

Os parâmetros foram registrados no sistema Brain Wave II (NeuroVirtual)®, utilizando os registros de EEG: F M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2, O1-M2; EOG: bilateral; EMG: mentoniano/submentoniano; EMG: tibi bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termísto esforço respiratório torácico e abdominal; saturação da oxi-hemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso sensor de ronco (microfone); posição corporal no leito.

Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2012. (AASM).

Exame iniciado 22h:42m:34s horas e concluído 06h:04m:11s horas. A latência para início do sono foi de 23,0 minutos e a latência para o sono REM foi de 127,0 minutos. O tempo total de sono foi de 435,8 minutos, com eficiência do sono (TTS / TTR)* de 85,8%. A distribuição do sono mostrou: 1,9% de estágio N1, 62,7% de estágio N2, 17,4% de estágio N3 e 18,0% de sono REM. No período total de sono permaneceu 38,7 minutos em vigília.

Ocorreram 55 despertares breves tendo o índice de (7,6/hora).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0/hora.

* (Classif. Patológica dos Movimentos Periódicos de Pernas - Walters e cols 1995; Leve: 5 a 24/hora; Moderado: 25 a 49/hora; Grave: > 50/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 59,6, a maior de 79 e a menor de 45.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 4,0/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 4,0/h sendo 0,3 apneia/hora e 3,7 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 25, sendo 23 hipopneias, 0 apnéias obstrutivas, 2 apnéias centrais e 0 apnéias mistas e 0 RERAS.

O tempo médio das apnéias foi de 16,1 segundos, com duração máxima de 20,4 segundos.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 83%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono TTR ⇒ Tempo Total de Registro

Dr. Major José dos Santos Moreira, 595 Centro Pindamonhangaba – SP
Tel (12) 3643-2044 – 36431889

www.institutodosonodovale.com.br

Resumo dos resultados

Poliissonografia realizada com o uso de CPAP onde resultados efetivos foram obtidos com a pressão de 8cmh2O, mostrando:

1. Índice de apnéia/hipopnéia dentro da normalidade;
2. Presença de ronco;
3. Eficiência do sono normal;
4. Latência para o sono REM aumentada;
5. Diminuição da porcentagem do sono REM;
6. Índice de despertares breves dentro da normalidade.

Dr. José Roberto Scapuccin
CRM 31347
ORL/Medicina do Sono

Dr. Marcelo Scapuccin
CRM 139174
ORL/Medicina do Sono

Dr. Fabio Scapuccin
CRM 146278
ORL/Medicina do Sono

Paciente: **YOSHIE, KANO**
Data do Exame: 15-10-2018