

ANNA CHRISTINA DE LIMA FERREIRA RIZZO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

HORA QUE DORME

HORA QUE ACORDA

SONECA DURANTE O DIA

IAH = 40,5/r
SpO₂ 81%

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

21 P = 11.8 cmHg
03 IAH = 3,2/r
22 M. de uso: 6:59 hr
Bem adapt.

08/04 P = 11.8 cmHg
22 IAH = 4.1
M. de uso: 6h50

05/04 P = 11.0 cmHg
22 IAH = 1.5
M. de uso: 4hr
masc. nasal
fua

12/04 P = 11.0 (parou de usar). fua.
24 recio máscara nasal.

16/04 tinha parado de usar → retomou uso.

20/5 tem sd Sjogren - queixa de secamento oral.

Auto 4 a 12 Fisher el haqueri Agueda

* comprou masc P30i ⑤. ↑ umidif. no máx.

22/07 P = 5 cmHg
20/5 IAH = 1,5/r
m. uso = 7h49 min
fuga = Relentil: 6,5 cmHg

↓ 4 a 8 cmHg - síria.

Nome: ANNA CHRISTINA DE LIMA FERREIRA RIZZO
Data de Nascimento: 5-6-1969
IMC: 32,05
Sexo: Feminino
Data do exame: 19-11-2021

Peso: 78 kg
Altura: 1,56 m
Médico: DR. MARCELO PIRES DE
OLIVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-11-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.
O tempo total de registro foi de 520,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 74,5 e 188,5 minutos. O tempo total de sono foi de 385,5, eficiência de 74,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 60,2%; estágio N3: 18,4%; sono REM: 19,1%. O índice de despertares foi de 17,0/hora (normal < 10/h).
O índice de apneia/hipopneia total foi de 40,5/hora, sendo elas 41 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 195 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 81%, permanecendo 2,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 89 bpm e NREM de 54 - 95 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 40,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE: