

NS 22222345131 / 896

MARCELO FALCAO ISIKAWO

→ Seguradora

SINTOMAS/ QUEIXA: Sonolência diurna / Sonambulismo (fala).

MEDICAMENTOS: Prurua (alguns dias)

HAS /

HORA QUE DORME:

HORA QUE ACORDA:

BANHEIRO

2X

TIPO DE RESPIRAÇÃO

nasal

EXERCÍCIO FÍSICO

esporádico.

Est. 1 = 1.2%

Est. 2 = 80.8%

Est. 3 = 9.3%

REM = 8.8%

Despert. 55g/h

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

PESO: 130

ALTURA: 1.75

IAH: 46.8

MALLAMPATI:

SPO2: 78%

18/05 Se mexe muito na cama. 2010 2013

23 Perdeu muito peso { (152kg - 90kg)
(2023 - 130kg)

Trombose após covid

25/05 P = 8.5 cmH₂O

23 IAH = 1.1 e/ev

m. de uso: 4h23'

Relato melhora do ressec., mas ainda

esta retirando a máscara.

fua.

13/06 Relato estar c/ dificuldade p/ manter o sono.

23 P = 8.0 mediana

IAH = 1.3 e/ev

m. de uso: 4h10' irá voltar exerc.

30/06 P = 8.5 cmH₂O

Orientei sobre ↑ de uso.

23 m. de uso: 4h30'

IAH = 1.1 e/ev

fua Cláudio

Relato que tem dormindo c/ CPAP, e
voltou a colocar de madrugada.

20/07 P = 8.5 cmH₂O

23 IAH = 1.2 e/ev

m. de uso: 4h16'

Recomendo o uso diário, retorno 20d. fua

11/08 P = 8.5 cmH₂O

Com pouco uso ele

23 IAH = 1.7 e/ev

relato, que retirou

m. de uso: 5hr

a máscara s/ perceber.

Fuga = 8.6 l/min.

Conseguir a fazer exerc. físico.

fua.

13/09 P = 7.9 cmH₂O

PAS: 8.5 cmH₂O

(P: 6 à 8.6 cmH₂O.)

2023 IAH: 1.6

m de uso = 4h20'

fuga = 13.7 l/min.

- usou poucas horas / tinha sono

- sugiro diário sono / atividade física

15/09 Comprou elite P: 8.4 cmH₂O

11/10/23 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 1,8 e/h
m de uso: 32,49'
fuga: 33 l/min

→ tornando pior

17/11/23 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 1,2 e/h
fuga: 31 l/min
m de uso: 5h 10 min

→ fúria glifos + Forxig

26/01
2024 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 0,9 e/h
m de uso: 6h 38 min
fuga: 28,9 l/min

→ está tornando Melatonina

→ oriento colocou água + iniciou atividade física.

12/04
24 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 1,3 e/h
m. de uso: 4h 58m
fuga: 39,1 (percentil)

- perdeu 10 kg

- usou pouco pois
teve alguns problemas
c/ cachorro

Oriento troca de filtro

Natacha

09/08
2024 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 0,6 e/h
m de uso: 5h 22'
fuga: 23 l/min

- não usou 10 dias, devido fúria

Silvia

oriento uso constante

05/02
25 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 0,7 e/h
m de uso: 5 horas
fuga: 33 l/min.

Bem adaptado.

está usando máscara N30i

→ Boca seca

usou atividade

10/04
25 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 2,3 e/h
m. de uso: 4h
fuga: 9,9 med - 50,9 perc.

meu

04/06
25 P: 8,4 cmH₂O
IAH: 0,6 e/h
m de uso: 4h 28'
fuga: 35,9 l/min (percentil)

Relata ter emagrecido
Oriento utilização
contínua

Natacha



OTORRINOLARINGOLOGIA

Clínica
Cirurgia

A. Menezes

Peso teste para

Exames
Audiológicos

CPAP para

Sr. Marcelo F. Iizawa
el Apneia Acetabular

Rinoplastia
Otoplastia

DR. PAULO ROBERTO FIGUEIREDO
Otorrinolaringologista
CRM-SP 83.257

Descrição do Exame Polissonográfico

MARCELO FALCAO ISIKAWA			
Idade: 60 anos	Peso: 130 Kg	Altura: 1.75 m	
Data do Exame: 31/03/2023	Exame: 12318_01		

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 11:13:16 PM horas e encerrado às 5:52:03 AM horas, com latência para o sono de 3 minutos e latência para o sono REM de 305 minutos. O tempo total de sono foi de 341.0 minutos, com eficiência de sono de 85.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.2%	Até 5%
Estágio 2	80.8%	45 - 55%
Estágio 3	9.2%	> 15%
Sono REM	8.8%	20 - 25%
Eficiência do sono	85.5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 55 minutos ocorreram **316 despertares** (índice de 6 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm , a maior de 79 bpm e a menor de 54 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 266 eventos respiratórios, sendo 0 central, 266 obstrutivos e 0 misto. Sendo 237 apnéias, 29 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 46.8/hora**, sendo 41.7 apnéia/hora e 5.1 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 26.1 e a duração máxima de 46.7.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 64.0/hora, sendo 64.0 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **97%**, sendo a saturação média de **94%**, a maior de **99%** e a mínima de **78%**, permanecendo 14.1 minutos (3.5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 267 dessaturações. Índice de dessaturações: 46.8/hora, Índice de dessaturações no sono REM: 62.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 45.0/hora.

Resumo dos resultados

Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo. Dessaturações da Oxihemoglobina.

Ronco presente.

Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).

Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200