

INDICADO POR: Dr. André Pereira

X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22222362656 | 378

MARCELO PASQUALI

IDADE: 44 PESO: 93kg ALTURA: 1,78m PROFISSÃO: Engenheiro

SINTOMAS: Pancoas presenciado, cansaço, etc

QUEIXAS: ataques episódicos de falta ar noite

MEDICAMENTOS: não toma

MÉDICO: Dr. André Pereira

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Paralela Rite 4x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 19h

HORA QUE DORME: 22-23h HORA QUE ACORDA: 5:30-6h

COCHILO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 433 SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não

CIRURGIAS: (N) NASAL (M) MAMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (M) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 CI/CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

14/01/25 Avaliação masc N30 (5)
Localização
Natacha16/01/25 Pautomático: 4-10 cmH₂O
IAH = 23,5 el/h (AC: 21,1 el/h)
Fixo pressão em P: 6 cmH₂O
Im: 5,3 el/h Pgo: 7,4 cmH₂O
Natacha22/01/25 P: 6 cmH₂O
IAH: 15,6 el/h (AC: 13 el/h)
Relatório detalhado mostra AC em blocos
na primeira parte da noite e na final
Aumentando P: 7 cmH₂O
Natacha

24/01/25 P=7 cmH₂O

IAH = 16,8 e/h (AC: 14,4)

m. de uso: 7h25'

fuga: 3,3 l/m

Relata sentir
congestão nasal

Natacha

06/02
25

P=7 cmH₂O

IAH = 22,4 e/h AC: 19,8 e/h

m. de uso: 7h10'

fuga: 5,4 l/m

Natacha

28/02
25

P=7 cmH₂O

IAH = 9,7 e/h (AC: 7,1 e/h)

m. de uso: 6h50'

fuga: 15,7 l/m

Bem adaptado

Natacha

16/03/25

P=7 cmH₂O

IAH = 11,2 e/h

m. de uso: 6h55'

fuga: 19 l/min

AC: 8,4 AO: 0,4 hip: 2,1

20/03/25

* comprou APP Bânico *

↓ P: 6,6 cmH₂O

Silvia

10/04

P: 6,8

IAH = 6,8

m. de uso: 7hs

fuga: 13,8

(↑ P = 7,0 ↑ P_i = 5,0)

15/05/25

P=7,0 cmH₂O

IAH = 7,9 e/h

m. de uso: 7horas

fuga: 18 l/min

↓ P: 6,8 cmH₂O

Silvia

13/06
25

P=7,0 cmH₂O

IAH = 6,4 e/h

M. de uso: 6h40'

Bem adaptado

Sua cláudia

Nome: MARCELO PASQUALI
Data de Nascimento: 16-3-1989
IMC: 29,04
Sexo: Masculino
Data do exame: 25-11-2024

Peso: 92 kg
Altura: 1,78 m
Médico: DR. ANDRÉ PEREIRA COSTA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 25-11-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 539,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 56,5 e 144,0 minutos. O tempo total de sono foi de 432,0 min, eficiência de 80,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 56,6%; estágio N3: 15,5%; sono REM: 25,1%. O índice de despertares foi de 27,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 43,3/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 174 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 79%, permanecendo 6,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 41 - 74 bpm e NREM de 40 - 77 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N2 do sono NREM aumentada e porcentagem dos estágios N1 e N3 do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 43,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157