

YH560A 225210009

DENIZE SILVA DE DEUS		Tec. de enfermagem
SINTOMAS / QUEIXAS	Cansaço / Dor de cabeça	
MEDICAMENTOS	Hipertensão / DM / Hipotireoidismo Tromboelastina / Zumbido	
HORA QUE DORME:	HORA QUE ACORDA:	
BANHEIRO	3 a 4x	IAH: 22 e/ev
TIPO DE RESPIRAÇÃO	Sim	
PRÁTICA EXERCÍCIO	Natação (2x) / Pilates (1x)	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: — ALMOÇO: OK LANCHE: OK JANTAR: OK		
IDADE: 58 a.	PESO: 63	IAH: 22 MALLAMPATI: 4 SPO2: 95/69%
13/01/23 Iniciou o uso do CPAP - (4-7.5 cmH ₂ O)		
20/01/23 P = 6,0 cmH ₂ O fixei a pressão. IAH = 3.4 e/ev m. de uso: 4hs fua.		
10/02/23 P = 6,0 cmH ₂ O IAH = 2.5 e/ev m. de uso: 4hs Bem adaptado fua		
14/04/2023 P = 6 cmH ₂ O (med 5,8) IAH = 2,3 e/ev m. de uso = 7h20' fluxo = 14 l/min • cansaço → natação. • 1x banho na noite • vai 13 exames cardíacos ECO...		
12/05/23 P = 6,0 cmH ₂ O IAH = 1.9 e/ev m. de uso: 7h32' Bem adaptada fua • Banheiro 2x • melhora da glicemia		
14/07/23 P = 5,8 cmH ₂ O P90 = 6,0 cmH ₂ O. IAH = 1,4 m. de uso = 6h30' fluxo = 8 - Bem adaptada - fua		
29/09/23 P = 6,5 IAH = 1.7 e/ev m. de uso: 8hs Bem adaptada, porém c/ HAS fua.		
08/12/23 P = 9 cmH ₂ O IAH = 1.7 e/ev m. de uso: 5h42' Fluxo = 17.8 l/min. Dor no 21m Acorda 7:30m. fua.		
30/01/24 P = 9 cmH ₂ O IAH = 1.7 m. de uso: 7h28' Bem adapt. fua		

12/04
24

$P = 6,3 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,1 \text{ e/h}$
 $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 12 \text{ min}$
Beu adaptada / queixa de despertar
no meio da noite e não
conseguiu voltar a dormir

Acorda com a
pressão alta

Natasha

23/06/24

$P = 6,3 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 2,1 \text{ e/h}$

$m. \text{ de uso: } 6 \text{ h } 26 \text{ min}$

fuga: $1,7 \text{ l/min}$

Relata que ainda acorda
cl pressão alta
Oriento higiene do sono

Natasha

06/09/24

$P = 6,3 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 1,3 \text{ e/h}$

$m. \text{ de uso: } 5 \text{ h } 52'$

fuga: $0,7 \text{ l/min}$

Relata melhora da
pressão cl a retirada
do sal dos alimentos

Natasha

21/02

$P = 9 \text{ cm H}_2\text{O}$

25

$IAH = 2,0 \text{ e/h}$

$m. \text{ de uso} = 6 \text{ h } 40'$

fuga: 33 lpm

Relata melhora da sonolên-
cia, diurna. E a PA dentro
da normalidade.

João Cláudio

Troco o fixador, lavo o umid.

09/05/25

$P = 6,5 \text{ cm H}_2\text{O}$

$Pmáx 9,0 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 1,8 \text{ e/h}$

$m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 15 \text{ min}$

fuga: 13 l/min

DR ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA
**LAUDO DA
POLISSONOGRAMA**

NOME: Denize Silva de Deus

EXAME nº: 5196

SOLICITADO POR: Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo

DATA: 12/08/2022

IDADE: 58 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h19min e concluído às 05h59min. A latência para o sono foi de 4 minutos e a latência para o sono REM, de 102 minutos. O tempo total de sono foi de 340 minutos (05h40min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 75,2%. A distribuição do sono mostrou 10,7% de estágio 1, 61,8% de estágio 2, 15,4% de estágio 3 e 12,1% de sono REM. No período total de sono permaneceu 107,5 minutos em vigília, ocorreram 62 microdespertares (índice: 10,9/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora. *slw*

O índice de apneia/hipopneia foi de 22,1/hora, sendo 1,6 apneia/hora e 20,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 22,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 95% e a mínima de 69%. - 95%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono

TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (59,4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (59,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 80 bpm. -

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava normal (86 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (93,7%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 26,1/hora; normal até 15/hora) - observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,1%; normal: 8-10%) e 3 (18,9%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (18,9%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (51,8%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (13,7/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730