

INDICADO POR: Dra Beatriz Ottonio☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ELZIO ANTONIO SOTEROIDADE: 76 PESO: 74 ALTURA: 1,63 PROFISSÃO: Engenheiro Mecânico (aposentado)SINTOMAS: Sonolência diurna, Roncos presenciados e engasgos, RefluxoQUEIXAS: MucorriaMEDICAMENTOS: Eutirox 50 / Rosuvastatina 10 / SildenafilMÉDICO: Dr. Luiz Gustavo (Grietra)MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: sedentárioHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 19hHORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 7hCOCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N SocialmenteFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: nao MALLAMPATI: IAH: SPO2:PATOLOGIAS ASSOCIADAS: arritmiaCIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Ramagnum Septa

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

06/08 Avaliação Leucocitos Auto 4 a 10 mil25Datacha

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (27,7 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina (66%);
3. Latência para o início do sono (60,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (41,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (61,9 %) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares 12,7 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (2,9 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (31,8 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (17,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (47,7 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;
12. Presença de alteração do ritmo cardíaco.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


Exame evidenciando aumento do índice de apnéia e hipopnéia de grau moderado

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: ELZIO ANTONIO SOTERO

Data do Exame: 13-02-2025

Peso: 75 kg

Médico Solicitante: DR. LUIZ GUSTAVO DE LELLO
BOCCIA RODRIGUES

Sexo: Masculino

Idade: 75 anos

Altura: 1,62 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 13/02/2025 20:47 e finalizado às 14/02/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de 60,0 min e a latência para o sono REM de 41,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 332,0 min, com eficiência do sono de 61,9 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,9 % de estágio N1, 31,8 % de estágio N2, 17,6 % de estágio N3 e 47,7 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 144,2 min. Ocorreram 114 despertares, sendo o índice de 12,7 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 153, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 153 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 27,7 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 23,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 31,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 27,7 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 27,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 90% e a mínima de 66%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 46,1 (nº/h), sendo que em REM foi de 67,8 (nº/h) e em NREM foi de 78,5 (nº/h). Permaneceu 23,8 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: ELZIO ANTONIO SOTERO

Data do Exame: 13-02-2025