

EURICO FERREIRA			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS			
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME		IAH 68.1/20	
PRATICA EXERCICIO			
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
11/08 22	P = 6.0 IAH = 2.8 M. de uso: 8hr Bem adaptado -	Jua	
26/08 22	P = 6.0 IAH = 1.9/2 M. de uso: 7h 14' Bem adaptado, ↑ a umidif.	Jua	
26/09 22	P = 6.0 IAH = 2.8 M. de uso: 7h 12' Bem adaptado	Jua	
04/11 22	P = 5.6 cmH ₂ O IAH = 2.0/ev M. de uso: 7h 8'		
13/01 23	P = 6.4 IAH = 2.0 M. de uso: 6h 30' Bem adaptado a máscara -	Jua	
22/03 23	P = 5.6 cmH ₂ O IAH = 1.3 e/ev M. de uso: 6h 30' Bem adaptado, utiliza bem porém reduziu o no de erros, carregou fez o uso à tarde	Jua	
15/05 2023	P = 5.6 cmH ₂ O IAH = 1.7 e/ev M. de uso: 6h 56'	* troquei filtro. bem adaptado.	

28/11
23 P = 5.6 cmH₂O
IAH = 2.1 e/ev
M. de uso 7hr

troco filtro

Jua

13/07/23: $P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,8 \text{ e/h}$
m de uso: 7horas
fuga: 17,9 l/min

- Bem adaptado

+ Faz Pilates 2x semana
musculação 3x semana

18/09/23

$P = 5,6$
 $IAH = 2,7 \text{ e/h}$
fuga: 17 l/min
m de uso: 7horas

Bem disposto

26/02/24

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,8 \text{ e/h}$
fuga: 16 l/min
m de uso: 6h47 min.

Bem disposto.

Atividade física de musculação
Pilates

22/10/24

24

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,7 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h36m
fuga: 4,6 l/min

Bem adaptado
cl beta ortopédica pois
caiu no banheiro em casa
ficou 40 dias st pisar no chão.

Bope: H

Natacha

24/06/24

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 19m
fuga: 14,6 l/min (percentil)

Bem adaptado

Natacha

19/08

24

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 26'
Fuga = 2.4 lpm.

esta vagando

Jua Cláudio

21/10/24

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,5 \text{ e/h}$
m de uso = 7h40 min
fuga = 7 l/min

Bem adaptado

usando másc-pillow (5) - tava mto apertada
ajusteí Silvi

18/12/24

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4 \text{ e/h}$
m de uso: 7h20
fuga 8 l/min

Bem adaptado

Silvi

24/02/25

$P = 5,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,3 \text{ e/h}$
m de uso = 7h40 min
fuga = 9 l/min

Bem adaptado

Silvi

05/05/05 P= 5,6 cm H₂O

IAH= 1,4 x/h

muco = 7240 min

fuga = 1381 min.

Bem Adaptado / Sem queixas:

caiu na rua há 2 meses
cirurgia na testa.

Silvia

04/08/25 P= 5,6 cm H₂O

IAH= 1,9 x/h

muco = 7220

fuga = 981 min.

tecido fibroso

Silvia

INDICADO POR: Dr. Machuca

(X) ACOMPANHAMENTO



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
CRM-SP: 69.730

Dra. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Eurica Ferreira

Solicito a compra do CPAP para
o tratamento da síndrome da apnéia do sono.

Pressão estabelecida: 6cm H₂O.

Máscara utilizada: nasal Mirage

Activa medium (Posmed®)

*Possibilidade do uso do umidificador

Att,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP

STC, 2/8/22

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Eurico Ferreira

EXAME nº: 5115

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 20/04/2022

IDADE: 89 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h58min e concluído às 06h43min. A latência para o sono foi de 4 minutos e a latência para o estágio REM, de 314 minutos. O tempo total de sono foi de 379,5 minutos (06h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87,6%. A distribuição do sono mostrou 20,2% de estágio 1, 60,9% de estágio 2, 16,9% de estágio 3 e 2,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 49 minutos em vigília, ocorreram 240 microdespertares (índice: 37,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 42,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 68,1/hora, sendo 38,7 apneia/hora e 29,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 68,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 81%.

(*) TTS: Tempo Total de Sono

TTR: Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (68,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (68,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 48; máxima: 61 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 4 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (314 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (87,6%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 37,9/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (20,2%; normal: 8-10%), 2 (60,9%; normal: 45-55%) e 3 (16,9%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (2,1%; normal: 20%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (42,1/hora; índice normal até 15/hora). Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 10 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS
PRÓPRIA, MATERIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DR. EUTÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Eurico Ferreira

EXAME nº: 5115-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 27/06/2022

IDADE: 89 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h12min e concluído às 06h49min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 316 minutos. O tempo total de sono foi de 407 minutos (06h47min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,1%. A distribuição do sono mostrou 10,4% de estágio 1, 61,8% de estágio 2, 14,1% de estágio 3 e 13,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 30 minutos em vigília, ocorreram 103 microdespertares (Índice: 15,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 76,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 12,5/hora, sendo 1,3 apneia/hora e 11,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 12,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 86%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (12,5/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (12,5/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 47; máxima: 59 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (316 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (90,1%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (15,2/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 2 (61,8%; normal: 45-55%) e 3 (14,1%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (13,6%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 1 (10,4%; normal: 8-10%) permaneceu no limite superior da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (76,8/hora; índice normal até 15/hora).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730