

Exame

Nome	Rafael Augusto Ferraz	Nascimento	25/10/1980 (45 anos)	Sexo	Masculino
Início	13/04/2026 - 21:49:11	Tempo total	08:39:24 (519,4 min)		
Fim	14/04/2026 - 06:28:35	Tempo válido	08:30:32 (510,5 min)		

Condições na noite do exame


- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado


Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%



Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

17 %min/hora


0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}



Intensidade do ronco registrado




Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 13/04/2026, iniciado às 21:49 e terminado às 06:28. O tempo total de registro foi de 8h39min (519 minutos) e o tempo válido foi de 8h30min (510 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 18 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 2,1/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 1% do tempo de registro (6 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 17% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 2,1/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Foram detectados eventos de ronco durante 17% do tempo de registro.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame

Nome	Rafael Augusto Ferraz	Nascimento	25/10/1980 (45 anos)	Sexo	Masculino
Início	13/04/2026 - 21:49:11	Tempo total	08:39:24 (519,4 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 13/04/2026

Peso 140 kg
Altura 1,78 m
IMC 44,2

Medicamentos

Respondido em 13/04/2026


☐ Nenhum
☒ omelsartana 40

Sintomas Respondido em 13/04/2026

☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☐ Sono não reparador
☐ Despertares frequentes
☐ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 13/04/2026

☐ Nenhuma
☒ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☐ Dislipidemia
☐ Câncer
☐ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Oximetria (SpO₂)Histograma SpO₂ (%)


SpO ₂ mínima	87%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	99%
Tempo com SpO ₂ < 90%	6,6 min (1%)
Número de dessaturações ¹	18
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	2,1 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	1,8 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	17,4 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	520,0 min
Tempo com ronco total	88,4 min (17%)
Tempo com ronco baixo	88,4 min (17%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	50 bpm
Média	62 bpm
Máxima	103 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	0
Tempo total em FA	-
Episódio de menor duração	-
Episódio de maior duração	-
Duração média dos episódios	-
Risco de FA	Baixo

Sono estimado

Tempo total de sono	494,5 min
Tempo para dormir	10,0 min
Tempo acordado pós-sono	12,5 min
Eficiência do sono	95%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).

2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.

6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.

7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Rafael Augusto Ferraz	Nascimento	25/10/1980 (45 anos)	Sexo	Masculino
Início	13/04/2026 - 21:49:11	Tempo total	08:39:24 (519,4 min)		

Polissonogramas

