

RICARDINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS

MEDICAMENTOS:

Rutorvastatim / Geifage / Ziconter / Libran

SINTOMAS/QUEIXAS

Sonolência (6h da tarde) / Irritabilidade / Prurido

BANHEIRO

5X

HORA QUE ACORDA

6h

HORA QUE DORME

23h

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE: 7:30

ALMOÇO: 12

LANCHE: 16

JANTA: 19h

22/06 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 1.1 l/h

m. de uso: 10h5'

Bem adaptada, ajuste o CPAP pl pressão fixa.

06/07 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 0.7 l/h

m. de uso: 7h48'

boa

28/07 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 0.7 l/h

m. de uso: 7h20'

boa

19/08 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 0.6

m. de uso: 7h35'

Bem adaptada, relata que não está acordando do muitos vezes

boa

18/10 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 0.8

m. de uso: 7h

TROCO O filtro

Bem adaptada, sl sonolência diurna

boa

13/12 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 0.9 l/h

m. de uso: 7h40'

Fuga = 21.6 l/min

Bem adaptada

boa

07/02 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 0.6 l/h

m. de uso: 6h52'

Bem adaptada, porém teve dor na coluna

boa

Nome: RICARDINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS
CASTRO

Data de Nascimento: 18-5-1963

IMC: 33,12

Sexo: Feminino

Data do exame: 16-05-2022

Peso: 88 kg

Altura: 1,63 m

Médico: DRA. SISSI QUIRINO SOUZA E
SILVA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 565,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 37,0 e 127,0 minutos. O tempo total de sono foi de 432,5, eficiência de 76,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 63,5%; estágio N3: 16,9%; sono REM: 17,3%. O índice de despertares foi de 16,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 15,8/hora, sendo 31 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 72 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 85%, permanecendo 1,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 76 bpm e NREM de 49 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 15,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,7/hora);
9. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado. Presença de bruxismo.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

18/05/63

NS

RICARDINA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS

SINTOMAS / QUEIXAS	Nota 10 satisfeito			
MEDICAMENTOS	Dosevastatina / gelifage 2x / Horadois (1cp) Reconten (1cp) / Pregabalina (1cp) / Atrato			
HORA QUE DORME:	HORA QUE ACORDA:			
BANHEIRO				
TIPO DE RESPIRAÇÃO				
PRÁTICA EXERCÍCIO				
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:	
IDADE:	PESO:	IAH:	MALLAMPATI:	SPO2:
05/04 2023	P = 9,8 cmH ₂ O IAH = 0,6 fuga = 27,1 l/min média = 6 h 40 min	} pontaria por 4 anos } aplicacão lombos nuno/2023 pelo ortopedista Ninguém língua céu boca atividade física		
* trocou máscara do kit wisp quer mais uma wisp (M).				
06/06 23	P = 9,8 cmH ₂ O m. de uso: 7h40 IAH = 0,4 e l/h	Bastante ansiosa, oriento atividade física Jue.		
04/07 23	P = 9,8 cmH ₂ O IAH = 0,5 e l/h m. de uso: 7h40 fuga = 26,6 l/min	Só foi 1x na atividade física Jue.		
13/11 23	P = 9,8 cmH ₂ O IAH = 0,2 e l/h m. de uso: 6h30 fuga = 24 l/min	↑ Píndice = 6,0 Jue.		
21/02 24	P = 9,8 cmH ₂ O IAH = 0,5 m. de uso: 6h44m fuga: 23,7	Natacha		
15/05 24	P = 9,8 cmH ₂ O IAH = 0,3 e l/h m. de uso: 8h2m fuga: 22,4 l/min	Realiza atv. física 2x semana Bem adaptada Natacha		

07/08

2024

$P = 9,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ l/h}$
 $m_{\text{uro}} = 30 \text{ l/min}$
 $f_{\text{uq}} = 7 \text{ h } 18 \text{ min}$

Bem adaptada
hoco filtro
Silvia

13/11

2024

$P = 9,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ l/h}$
 $m_{\text{uro}} = 7 \text{ h } 46 \text{ min}$
 $f_{\text{uq}} = 41,6 \text{ l/min}$

hoco máscara (estava quebrada)

↳ fuzelel nasal (M).

Silvia

12/02

2025

$P = 9,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ l/h}$
 $m_{\text{uro}} = 7 \text{ h } 47 \text{ min}$

fez cirurgia olho - blefaroplastia em unao CPAP
por 1 semana

$f_{\text{uq}} = 53 \text{ l/min}$ → máscara mal ajustada - oienbo.

Silvia

13/05

25

$P = 9,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ l/h}$
 $m_{\text{de ura}} = 6 \text{ h } 22'$

$f_{\text{uq}} = 51,5 \text{ l/min}$ → fixador saltando, pte
acabou costurando.

Natasha