

LUCIENE TEIXEIRA DE PAULA	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

02/06 P = 13,8 percentil

21 Fuga = 46,1

IAH = 6,1/h

Troux a máscara.

13/06 P = 14,9

21 AHI = 5,1

m. de uso 5hs

APAP 14.9 / EPAP 8.1 / AHI 5.1 / AHI 3.0

EPAP 14.

IAH = 7.8/h

medic. de vazamento: 2%

Encaminhado p/ Drº Alberto — Jua

11/08 IPAP = 13

EPAP = 7

M. de uso: 3h47'

IAH = 10.4

Relatório Drº Gisela

Jua

duvidas 23/08/21

07/12 P = 14.

21 IAH = 3.8

m. de uso: 6hs

Jua

15/02 P = 14.6

22 IAH = 4.6

m. de uso: 3hs (ajuste máscara)

Jua

28/03 P = 14.6

24 IAH = 3.0

Jua

12/07 P = 10.0 cmH₂O

24 IAH = 3.2 euv

m. de uso: 4:40'

(↓ 10 Kg)

Jua.

04/10 P = 10.

24 IAH = 3.3

M. de uso: 4h36'

fuga = 7.2 lpm

Jua Cíndia

30/10 P = 8.8

24 IAH = 3.8

m. de uso: 4hs

Bem adaptado

(↓ 3kg)

Jua

29/11/24 não estava conseguindo usar
horário másc N30i ⑤.

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 6,9 \text{ med} \\ P_{90} = 8,6 \text{ cmH}_2\text{O} \\ IAH = 6,6 \text{ cmH}_2\text{O} \end{array} \right.$$

Silvia

06/02
25 $P = 6,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 4,3 \text{ e/h}$
m de uso: 4h 16'
fuga: 11l/m

Relata não conseguir usar
máscara sufocada
17 dias de uso
Natasha

09/04
25 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3,6 \text{ e/h}$
m de uso: 3h 40'
fuga: 11,4l/m

17 dias de uso
Esquece de colocar máscara
Natasha

27/05
25 $P = 6,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3,9 \text{ e/h}$
m de uso: 3h 39'
fuga: 13l/m

usou 20/30 dias
10 < 4h

Natasha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUCIENE TEIXEIRA DE PAULA			
Sexo: F	Idade: 48 anos	Peso: 82 Kg	Altura: 1,63 m
IMC: 30,9	Data do Exame: 10/02/2021	Exame: 21223_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:58:14 horas e encerrado às 06:02:04 horas, com latência para o sono de 38 minutos e latência para o sono REM de 281 minutos. O tempo total de sono foi de 285,0 minutos, com eficiência do sono de 78,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,2%	Até 5%
Estágio 2	78,2%	45 - 55%
Estágio 3	13,5%	> 15%
Sono REM	7,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	78,0%	> 85%

No período total de sono permaneceu 80,5 minutos acordado e ocorreram 281 micro despertares (índice de 59,2 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71 bpm, a maior de 87 bpm e a menor de 63 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 279 eventos respiratórios, sendo 1 central, 278 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 58,7/hora, sendo 46,3 apnéia/hora e 12,4 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 102,0/hora, sendo 90,0 apnéia/hora e 12,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 91%, a maior de 97% e a mínima de 67%, permanecendo 37,1 minutos (10,1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 3,8 minutos (1,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 281 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo, exceto um de origem central.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Bruno do Andrade Soares
Otorrinolaringologista /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075

Sleep Study Report

Name of Patient: Luciene Barbosa
Name of Referring Doctor: Dr Bruno Soares
Date of Study: 21/11/2023

Prezado Luciene Barbosa,

Agradecemos por ter se submetido ao estudo do sono de noite inteira com o Watch-PAT. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 7 hrs, 22 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 5 hrs, 38 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI-apnea/hypopnea index) foi de 57,9. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 62,9. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 41,5. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 12,7% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, favor nos contatar.

Atenciosamente,

Dr. BRUNO SOARES
Otorrinolaringologista
CRM: 104.075

Printed on: 21/11/2023