

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome MARIA DE FÁTIMA FARIA CARNEIRO

Data de nasc. 07/07/1957 (65 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 04/07/2023 – 22:35:51

Fim 05/07/2023 – 06:37:11

Tempo total 08:01:20 (481,3 min)

Tempo válido 07:04:21 (424,4 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool

☐ Congestão nasal

☒ Sedativos

☐ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP (08:00)

☐ Aparelho de avanço

☐ Nenhum

Questionário do exame**Peso e altura**

Respondido em 10/01/2023

Peso 69 kg

Altura 1,57 m

IMC 28,0

Sintomas

Respondido em 10/01/2023

☐ Ronco alto e frequente

☐ Dificuldade para manter o sono

☒ Sono agitado

☐ Sono não reparador

☒ Sonolência ou cansaço diurno

☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

☐ Dificuldade de concentração

☐ Perda de memória

☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 10/01/2023

☒ Hipertensão arterial sistêmica

☐ Doença arterial coronária

☐ Insuficiência cardíaca

☐ Arritmia cardíaca

☐ Acidente vascular cerebral (AVC)


☐ Diabetes

☒ Depressão

☐ Refluxo gastroesofágico

☐ Doença respiratória

☐ Nenhuma

Resultado**Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)**

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 04/07/2023, iniciado às 22:35 e terminado às 06:37. O tempo total de registro foi de 8h01min (481 minutos) e o tempo válido foi de 7h04min (424 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 38 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 5,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 11% do tempo de registro (50 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 5% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 5,4/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Polissonografia tipo IV de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	82%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	98%
Tempo com SpO ₂ < 90%	50,4 min (11%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	38
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	5,4 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	5,5 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	49 bpm
FC média	55 bpm
FC máxima	85 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	353,0 min
Tempo para dormir	29,0 min
Tempo acordado pós-sono	70,5 min
Eficiência do sono	73%

Análise de ronco

Tempo de gravação	479,0 min
Tempo com ronco	24,0 min (5%)



Polissonogramas

