

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 227310018

TANHAMARA DE PINHO

IDADE: 66 PESO: 70 ALTURA: 1,59 PROFISSÃO: Produtora de Queijo.
 SINTOMAS: Dor de cabeça, Refluxo gástrico, sonolência
 QUEIXAS:
 MEDICAMENTOS: Amitil
 MÉDICO: Dr. André
 MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N
 EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 8 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 18h
 HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 4:30h
 COCHILHO ☒ SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: não
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 14,2 e/h SPO2: 84%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
 CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:
 COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA
 () ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

13/09/24 Avaliação

20/09/24 Pmedia: 4,5 auH₂O

IAH = 2,9 e/h

mdc uso: 5h

fuq: 7,2 l/m

Relata se sentir

subocada c/ máscara

Orienta uso esponadrape

Natasha

27/09/24 P = 5,4 auH₂O

IAH = 3,7 e/h

mdc uso: 5h 48m

fuq: 2,2 l/m

fixo P = 6 auH₂O

Natasha

08/10/24 Pte relata melhora dos dois

de cabeça, volta p/ modo automático

P = 5-8 auH₂O

IAH = 2,4 e/h

Natasha

11/10/24 Consulta On line, pte relata melhora
 do dor de cabeça

Natasha

29/10/24 $P = 4-8 \text{ cmH}_2\text{O}$ / média $P = 4,3 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 3 e/h
mde uso: 5h 28'
fuq: 1 l/m

Bem adaptada

Natasha

04/12 24 $P = 5,9 \text{ cmH}_2\text{O}$ (medic)

IAH = 6,4 e/h
mde uso: 6h 18'
fuq: 0

Bem adaptada

Natasha

12/02 25

$P = 5,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 6,4 e/h
mde uso: 7h 03'
fuq: 1,1 l/m

Bem adaptada

Natasha

02/07/2025

$P = 6,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 9,9 e/h
m uso = 7h 07 min
fuq = 0,4 l/min

Boca seca

PAO: 8,0 cmH₂O

Queixa afélica; rouquidão

sentir garganta fechada → colorímetro O₂

↳ retorno em 1 sem / vou fazer relatório

pra domínio e endócrino.

refere gonho pelo AA

11/07/2025 $P = 4,6 \text{ cmH}_2\text{O}$ Percentil 5,8 cmH₂O

IAH = 1,7 e/h
m uso = 7h 55 min
fuq = 0,1 l/min

sem queixa afélica

$\left\{ \begin{array}{l} \text{SpO}_2 \text{ méd: } 95\% \\ \text{SpO}_2 \text{ mín: } 90\% \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{FC méd: } 77 \\ \text{FC máx: } 105 \\ \text{FC mín: } 66 \end{array} \right.$

* fazer relatório endócrino.

$\downarrow P: 4 \text{ a } 6,5 \text{ cmH}_2\text{O}$

terapia: 5 cmH₂O

Nome: TANHAMARA DE PINHO
Data de Nascimento: 1-2-1958
IMC: 27,69
Sexo: Feminino
Data do exame: 27-07-2024

Peso: 70 kg
Altura: 1,59 m
Medico: DR. ANDRÉ PEREIRA COSTA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 566,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 72,0 e 111,0 minutos. O tempo total de sono foi de 389,5, eficiência de 68,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 56,5%; estágio N3: 17,1%; sono REM: 24,8%. O índice de despertares foi de 5,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 14,2/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 92 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 84%, permanecendo 1,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 64 - 90 bpm e NREM de 64 - 89 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 14,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=84%);
5. latência para o sono aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,2/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau leve.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157