

INDICADO POR: Dra Catharina)

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

DIEGO NUNES FERNANDES

IDADE: 43 PESO: 142 ALTURA: 1,78 PROFISSÃO: Contador.

SINTOMAS: Cansaço diurno, Sonolência diurna grave,
Engasgos presenciados, roncos presenciados.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Naprix | Duxten

MÉDICO: Dra Catharina (Otorino)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Sedentário.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20:30-21h

HORA QUE DORME: 0h

HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILO () S ☒ NDORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: relata que é bucal

BANHEIRO/NOITE: 3-4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 106cm

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 3/4h SPO2: 96%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS | leve edema MMII

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

08/08/25 Amieirão Pacaço Auto @ 5-12 cmH₂OInicial: 4 cmH₂O

Natasha

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (24), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**93,1 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**56%**);
3. Latência para o início do sono (**29,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**49,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**92,8 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **4,9 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**2,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**54,4 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**12,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**30,5 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: DIEGO NUNES FERNANDES

Sexo: Masculino

Data do Exame: 03-07-2025

Idade: 43 anos

Peso: 141 kg

Altura: 1,78 m

Médico Solicitante: DRA. CATHARINA SOARES DE ANDRADE

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 03/07/2025 21:57 e finalizado às 04/07/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de **29,5 min** e a latência para o sono REM de **49,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 434,5 min, com eficiência do sono de **92,8 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,4 %** de estágio N1, **54,4 %** de estágio N2, **12,7 %** de estágio N3 e **30,5 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 4,3 min. Ocorreram 38 despertares, sendo o índice de **4,9 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 674, sendo 601 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 3 apneias mistas, 70 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **93,1 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 81,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 98,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de **93,1 (nº/h)**, sendo 83,4 apneia/h e 9,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 92%, a média de 85% e a mínima de 56%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 91,9 (nº/h), sendo que em REM foi de 86,5 (nº/h) e em NREM foi de 104,1 (nº/h). Permaneceu 59,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: DIEGO NUNES FERNANDES

Data do Exame: 03-07-2025