

NS 22231567717 / 659

MARIA VERONICA DOS REIS

IDADE: 80a PESO: 80kg ALTURA: 1,60 PROFISSÃO:
 SINTOMAS: varca; parafuso; dorme mal; dorme demais
 QUEIXAS: Boca seca
 MEDICAMENTOS: HAS; Depressão; Colesterol (simvastatina);
 Rimeron / Deri.
 MÉDICO: Dr. Claudio / Dr. Ramiro.
 EXERCÍCIO FÍSICO:
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR: 22:00
 HORA QUE DORME: 2h; 3h HORA QUE ACORDA: 11h30 12h30'
 COCHILO ()SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO ()SIM (X)NÃO ()EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA ()NÃO
 FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 5X
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: MALLAMPATI: II IAH: 50,7 e/h SPO2: 76%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
 CIRURGIAS: ()NASAL ()AMIGDALECTOMIA
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
 COMORBIDADE: ()RESPIRATÓRIA ()ENDÓCRINA ()CARDÍACA
 ()ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS
 PSG = com titulação CPAP: 10,0 cmH₂O out/2022.

18/07/23. Locaflo / Resmed Elite P: 10cmH₂O
 másc. Full el Nape (M) (orientei sobre uso)

08/08/23 P= 10
 IAH = 3.2 Bem adapt.
 m. de uso: 11h Início a caminhando
 Fuga = 11.1 lpm. fua.

21/08/23 P= 10cmH₂O
 IAH = 2.0 e/h não está fazendo
 m. de uso: 9h52' a caminhando.
 Fuga = 10.4 e/h l/min. 3x bomb. fua.

21/09/23 P= 10cmH₂O
 IAH = 2.1 1 à 2x
 m. de uso: 10:17h fua

09/10/23 P= 10cmH₂O
 IAH = 2.1 e/h melhora parafuso
 m. de uso: 10h relata melhora da
 depressão - fua.

19/12/23 P= 10 cmH₂O
 IAH = 2.1 e/h Relata melhora
 m. de uso: 47.1 l/min do sono
 Boca seca - fua.

15/03/24 P= 10cmH₂O
 m. de uso: 9h 26' Com infecção de urina
 IAH = 2.3 e/h tomando antibiótico
 Fuga = 38 lpm. Troco filtro
 fua

02/05
24

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,8 \text{ e/lv}$
m. de uso: 9h
Fuga = 34,8 lpm.

sem adaptada.

07/06
24

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,8$
m. de uso 9h11'
Fuga = 30,2 lpm.

sem adapt.

lua

16/08/24

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,6 \text{ e/lh}$
m de uso: 8h26'
fuga: 45,8 e/m

Troca filtro e
Boja da máscara
*

Natasha

06/09
24

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3,4 \text{ e/lv}$
M. de uso: 10:24'
fuga = 29,1 lpm.

lua

06/11
24

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,6 \text{ e/lv}$
M. de uso: 9h27'

- Boca seca.

- 4x banheiros (oriento a
ao uso) gua clorada

12/02
25

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,9 \text{ e/lh}$
m de uso: 9h34'
fuga: 34,4 l/m

Troca filtro
Peça quebrada da
máscara
Natasha

11/04/25

$P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3,6 \text{ e/lh}$
m de uso: 10h22'
fuga: 41,3 l/m

Troca filtro
Troca fixador
da máscara
Natasha

Nome: MARIA VERÔNICA DOS REIS
Data de Nascimento: 5-7-1943
IMC: 30,12
Sexo: Feminino
Data do exame: 25-04-2022

Peso: 81 kg
Altura: 1,64 m
Médico: DR. RAMIRO SIENRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 25-04-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 496,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 81,0 e 142,5 minutos. O tempo total de sono foi de 258,0, eficiência de 52,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 54,5%; estágio N3: 19,6%; sono REM: 22,3%. O índice de despertares foi de 19,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 50,7/hora, sendo elas 23 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 113 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e mínima de 76%, permanecendo 81,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 62 - 94 bpm e NREM de 62 - 90 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 50,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=76%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (9,8/hora);
8. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

Nome: MARIA VERÔNICA DOS REIS
Data de Nascimento: 5-7-1943
IMC: 32,05
Sexo: Masculino
Data do exame: 08-10-2022

Peso: 80 kg
Altura: 1,58 m
Médico: DR. JEFFERSON K. TAKEHARA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 08-10-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 457,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 124,5 e 198,5 minutos. O tempo total de sono foi de 199,0, eficiência de 43,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,8%; estágio N2: 57,5%; estágio N3: 17,6%; sono REM: 20,1%. O índice de despertares foi de 16,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 7,5/hora, sendo elas 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 21 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e mínima de 82%, permanecendo 27,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 85 bpm e NREM de 57 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (01), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (84,4/hora);
7. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 10,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57