

NS YH550A * 227 390418

SERGIO DANIEL BORGES -

IDADE: 51a PESO: 178 ALTURA: 84 PROFISSÃO: Adm.
 SINTOMAS: Sonolência diurna / memória e concentração
 QUEIXAS: Ansiedade
 MEDICAMENTOS: Fletretina

Glicemia (limite)
 MÉDICO: Dr. Alberto Dorme: D. ✓
Antes de dormir: celular

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhando todos os dias (qualquer horário)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: 12 LANCHE: frutas JANTAR: -

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6h
 COCHILO (X) SIM () NÃO + 1h DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: - CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: nega MALLAMPATI: IV IAH: 50. e/hv SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Derrio septo (6 meses)

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: hínta / sínusite
 COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (M) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (M) NEUROLÓGICA () OUTROS

22/08/23 Localização: quWell máx. Diametral

25/08/23 P = 6 cmH₂O → houve aparelho por hemmed clp
 IAH = 4,8 e/hv Pura fixa: 6 cmH₂O.
 m. uso = 6h50'
 fuga = 41 min.

29/08/23 P = 6 cmH₂O
 IAH = 2,4 e/hv 2 meses retorno - fuga
 m. de uso: 6h11'

05/09/23 P = 6 cmH₂O ↑ P = 6,5
 IAH = 3,2 e/hv (3,2) fuga
 m. de uso: 6h15'

20/09/23 P = 6 cmH₂O (P. fixa) P. inicial: 4 cmH₂O
 IAH = 2,8 e/hv amidiq. 2 → 5 cmH₂O
 m. de uso = 6h12' Bem Adaptado.
 fuga = 61 min.

Sluplive 3900,00 (branco)
 16/11/23 P = 6,0 cmH₂O
 IAH = 2,7 e/hv
 m. de uso: 4h51'
 Fuga = 12.3 e/min. fuga

15/01 2024 P= 6 cmH₂O
IAH= 2,2 cl/h
m de uso: 5 horas
fuga: 12 l/min

nao está usando direito;
feias - n' uso
perdeu a mãe recentemente
- afue do avido → buximos acentuados

22/03/24 P= 6 cmH₂O
IAH= 2,6 cl/h
m de uso: 5 h 53 m
fuga: 11,3 l/m

- não utiliza quando
viaja
- ficou resfriado ~~ao~~ recenti-
mente

Natacha

29/05/24 P= 6 cmH₂O
IAH= 2,3 cl/h
m de uso: 5 h 7 m
fuga: 13,6 l/m

Beu adaptado

Natacha

11/09 24 Aparelho q' ~~teve~~ 2 (sensor de fluxo) ~~fue~~

28/01/25 P= 6,6 cmH₂O (media)
IAH= 2,5 cl/h
m de uso: 4 h 45'
fuga: 5,7 l/m

Relata tirar a mascara
na meio da noite

fixo P= 6,5 cmH₂O
Natacha

25/02 25 P= 6,5 cmH₂O
IAH= 2,6 cl/h
m de uso: 5 h 23'
fuga: 10,1 l/m

Melhorou horas de uso

Natacha

28/05 25 P= 6,5 cmH₂O
IAH= 2,3 cl/h
m de uso: 4 h 46'
Fuga: 9,0 l/m

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Sérgio Daniel Borges

EXAME nº: 5383-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 19/07/2023

IDADE: 51 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LÓPEZ
CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62.804

Comentários:

Exame iniciado às 22h06min e concluído às 06h10min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 110 minutos. O tempo total de sono foi de 474,5 minutos (07h54min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 97,7%. A distribuição do sono mostrou 5,7% de estágio 1, 67% de estágio 2, 7,2% de estágio 3 e 20,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 8 minutos em vigília, ocorreram 57 microdespertares (índice: 7,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 8,1/hora, sendo 1 apneia/hora e 7,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 8,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 84%.

(*) TTS⇒ Tempo Total de Sono

TTR⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (8,1/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (8,1/hora), ritmo cardíaco sinusal e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 64 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 21h30min. A latência para o estágio REM estava normal (110 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (97,7%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (7,2/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio 2 (67%; normal: 45-55%) e a redução dos estágios 1 (5,7%; normal: 8-10%) e 3 (7,2%; normal: 10-12%). A porcentagem do estágio REM (20,1%; normal: 20%) permaneceu no limite da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730