

## Exame

|        |                                   |              |                      |      |           |
|--------|-----------------------------------|--------------|----------------------|------|-----------|
| Nome   | Marcolino Dos Anjos Pires Tavares | Nascimento   | 02/08/1959 (66 anos) | Sexo | Masculino |
| Início | 25/08/2025 – 23:03:40             | Tempo total  | 08:04:04 (484,1 min) |      |           |
| Fim    | 26/08/2025 – 07:07:44             | Tempo válido | 07:53:35 (473,6 min) |      |           |

## Condições na noite do exame


- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

## Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

## Resultado


### Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)<sup>1,2</sup>




Valores de referência

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| IDO < 5       | Normal                   |
| 5 ≤ IDO < 15  | Apneia do sono leve      |
| 15 ≤ IDO < 30 | Apneia do sono moderada  |
| IDO ≥ 30      | Apneia do sono acentuada |

### Tempo com SpO<sub>2</sub> < 90%




### Carga hipóxica<sup>4</sup> • Risco cardiovascular



### Risco de FA<sup>5,6,7</sup>



### Intensidade do ronco registrado




Exame de polissonografia realizado no dia 25/08/2025, iniciado às 23:03 e terminado às 07:07. O tempo total de registro foi de 8h04min (484 minutos) e o tempo válido foi de 7h53min (473 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 10 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 1,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO<sub>2</sub>) teve valor médio de 94% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 3% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

## Conclusão

Exame normal (IDO 1,3/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta  
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

### Exame

|        |                                   |             |                      |      |           |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------|-----------|
| Nome   | Marcolino Dos Anjos Pires Tavares | Nascimento  | 02/08/1959 (66 anos) | Sexo | Masculino |
| Início | 25/08/2025 - 23:03:40             | Tempo total | 08:04:04 (484,1 min) |      |           |

### Ficha médica

#### Medidas corporais

Respondido em 25/08/2025

|        |        |
|--------|--------|
| Peso   | 80 kg  |
| Altura | 1,77 m |
| IMC    | 25,5   |

#### Medicamentos

Não respondido

☐ Nenhum


#### Sintomas Respondido em 25/08/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☒ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

#### Doenças associadas Respondido em 25/08/2025

- ☐ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

### Oximetria (SpO<sub>2</sub>)




|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| SpO <sub>2</sub> mínima                                  | 90%            |
| SpO <sub>2</sub> média                                   | 94%            |
| SpO <sub>2</sub> máxima                                  | 98%            |
| Tempo com SpO <sub>2</sub> < 90%                         | 0,0 min (0%)   |
| Número de dessaturações <sup>1</sup>                     | 10             |
| Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) <sup>1,2</sup> | 1,3 /hora      |
| Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)                | 0,7 /hora      |
| Carga hipóxica (hypoxic burden) <sup>4</sup>             | 2,5 %.min/hora |
| Número de eventos de hipoxemia <sup>3</sup>              | 0              |
| Tempo total em hipoxemia <sup>3</sup>                    | 0,0 min (0%)   |

### Análise de ronco

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tempo de gravação     | 482,0 min     |
| Tempo com ronco total | 14,5 min (3%) |
| Tempo com ronco baixo | 0,0 min (0%)  |
| Tempo com ronco médio | 9,6 min (2%)  |
| Tempo com ronco alto  | 4,8 min (1%)  |

### Frequência cardíaca



|        |         |
|--------|---------|
| Mínima | 46 bpm  |
| Média  | 71 bpm  |
| Máxima | 103 bpm |

### Fibrilação atrial (FA) estimada<sup>5,6,7</sup>

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Número de episódios         | 0     |
| Tempo total em FA           | -     |
| Episódio de menor duração   | -     |
| Episódio de maior duração   | -     |
| Duração média dos episódios | -     |
| Risco de FA                 | Baixo |

### Sono estimado

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tempo total de sono     | 364,5 min |
| Tempo para dormir       | 25,0 min  |
| Tempo acordado pós-sono | 92,0 min  |
| Eficiência do sono      | 75%       |

#### Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO<sub>2</sub>).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO<sub>2</sub> permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.


Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

## Exame

|        |                                   |             |                      |      |           |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------|-----------|
| Nome   | Marcolino Dos Anjos Pires Tavares | Nascimento  | 02/08/1959 (66 anos) | Sexo | Masculino |
| Início | 25/08/2025 - 23:03:40             | Tempo total | 08:04:04 (484,1 min) |      |           |

## Polissonogramas



Nº de série Oxistar 05990, versão do firmware 02.001.001; Aplicativo: plataforma ios, versão 2/1.15.0; Processamento: examprocserver-1.10.3, examreport-?; Documento gerado em 26/08/2025 às 08:41:42 BRT