

JOAO OLIMPIO ANDRADE CAMPOS

HD:

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

Dr. Márcio Jorge / M. Carlos Magalhães

11/10

m. de uso: 8h50'

21

IAH = 22.8 (AD = 6.6 / H = 2.7 / A = 8.9)

19/10/21

pê leve adaptado, com IAH = 17.6/ev

fua

26/10/21

P = 12.9

IAH = 16.0

m. de uso: 8hr

Fuga = 25.4 ehm

fua

16/11

P = 12.5

21

IAH = 12.9

m. de uso: 7h50'

fua

16/12

P = 12.3

21

IAH = 9.9

m. de uso: 7h30

fua

15/02

P = 11.9

22

IAH = 7.6

m. de uso: 7h34'

fua

10/05

P = 10.3

↓ a pressão

22

IAH = 6.2

m. de uso: 7h27'

fua

12/07

P = 10.3 cmHg

22

IAH = 5.2/h

m. de uso: 7h45'

fua

15/09 P=10,4 cmH₂O
22 IAH=5,7 e/h
M. de uso: 7h43'
Bem adaptado

16/11
22 P=10,4 cmH₂O = 9,7 cmH₂O
IAH=9,5 cmH₂O
M. de uso: 7h24'
Fuga=27 l/min

28/02 P=7,1 / 9,1 cmH₂O
23 M. de uso: 7,3 l/min
IAH=4,1 e/h
Peso 100 kg

Atarant 16 (elequis 5mg) Pleuauce 10mg
Milgama (neuropatia)
Finasterida

Oriento sobre a 4 da calcinha da cama.

05/04 P=8,8 / 6,6 (med.) Elevar a calcinha
23 IAH=6,6 e/h melhorou o IAH.
M. de uso: 7h20' Que.

21/06 P=7,5 cmH₂O (Perc. 10 cmH₂O)
23 IAH=4,7
M. de uso: 7h36'
Fuga=10,2 l/min Bem adaptado Que.

21/09 P=7,1 (med.) / Perc. (9,5 cmH₂O)
23 IAH=4,8 e/h
M. de uso=7h21'
Fuga=13,8
Bem adaptado. Jua cãndia

13/12/23 P=6,7 cmH₂O P90:9,2 cmH₂O Auto 5 a 10,4 cmH₂O
IAH=4,3 e/h
M. de uso=7h06' Bem adaptado
Fuga=11 l/min

21/02 P=6,2 cmH₂O (med.) / Perc. 95% 8,8.
24 Fuga=31,4 (95%) Jua
IAH=6,4 e/h

P = 5 - 10.4 cmH₂O → med. 6.4

IAH = 3.8 e/ev

m. de uso: 06.55.00

TRACO.

Fuga = 13.2

11/09/24 P = 7.4 cmH₂O

Auto 5 a 8.4 cmH₂O

IAH = 9.7 e/ev

m. uso = 7h00 min

fuga = 12l/min

Boca nova: ~~rosa~~ ~~feliz~~

Dermatite Atópica rosto → protetor
de algodão.

04/12 P = 7.0 cmH₂O med - Perc. 8.2 cmH₂O

2/4 Oriento o uso da masc. autoch

IAH = 11.4 e/ev

m. de uso = 7h

fuga

P = 8.4 cmH₂O

IAH = 17.5 { 9.9 AC | IAH = 4.7 | IA = 10.1 }

m. de uso: 7h17'

fuga = 13.5

fuga claudia

Exame do Sono Biologix

Centro credenciado

INSTITUTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS - ARRITMOCENTER

Telefone 12 98280-0272

Paciente

Nome João Olímpio Andrade Campos
Data de nasc. 30/03/1940 (81 anos)
Sexo Masculino

Exame

Início 04/10/2021 - 23:26:48
Fim 05/10/2021 - 05:31:26
Tempo total 06:04:38 (364,6 min)
Tempo válido 05:55:53 (355,9 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura
Respondido em 04/10/2021

Peso 120 kg
Altura 1,73 m
IMC 40,1

Sintomas

Respondido em 29/09/2021


- ☐ Ronco alto e frequente
☒ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☐ Sono não reparador
☒ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas


Respondido em 29/09/2021

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☒ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado



Tempo com $SpO_2 < 90\%$



Valores de referência para o IDO

- $IDO < 5$ Normal
 $5 \leq IDO < 15$ Compatível com apneia do sono leve
 $15 \leq IDO < 30$ Compatível com apneia do sono moderada
 $IDO \geq 30$ Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 04/10/2021, iniciado às 23:26 e terminado às 05:31. O tempo total de registro foi de 6h04min (364 minutos) e o tempo válido foi de 5h55min (355 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 441 dessaturações de oxigênio durante o registro. O IDO foi de 74,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO_2) teve valor médio de 88% e permaneceu abaixo de 90% durante 67% do tempo de registro (238 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 61% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 74,4/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO_2 abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Pedro Rodrigues Genta
Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO_2). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO_2 permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.