

JOSÉ EGIDIO ANDREACI

MEDICAMENTOS:	Rosuvastatina / Benicar / glifage / Seretide
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência / Roncos / Tontas
BANHEIRO	(3x) atualmente (1x)
HORA QUE ACORDA	6
HORA QUE DORME	23

IAH = 3.3/lv

PRATICA EXERCICIO

Hidro 2x

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

25/09 P = 9.5 cm H₂O

IAH = 3.6/lv

m. de uso: 6h36'

Bem adaptado

Jua

10/10 P = 8.8 cm H₂O

22 IAH = 3.1

m. de uso: 6h45'

Jua

31/10 P = 8.1 cm H₂O

22 IAH = 2.4/lv

m. de uso: 7h8'

Bem adaptado

Jua

12 P = 9.7 cm H₂O

22 IAH = 2.4 e/lv

m. de uso: 7:20'

Bem adaptado s/ queixas.

Jua

23/01 P = 9.7 cm H₂O

23 IAH = 1.8 e/lv

m. de uso: 3.6 l/min.

Bem adaptado, sem queixas, usa ar cond.

Caminhar 1x na semana

Jua

27/03 P = 9.3 cm H₂O

23 IAH = 1.7 e/lv

m. de uso: 7h20' * oriento p/ lavar o bôjo de 2 em 2 dias - Jua

26/06 P = 7.0 cm H₂O

23 IAH = 1.8

m. de uso 7:30

Faço relatório

Tudo o filtro

e bôjo

Jua

11/09/23 P = 5.6 cm H₂O

IAH = 2.1 e/h.

fuga = 6 l/min.

m. de uso = 7horas.

PQS: 7.1 cm H₂O

- Bem adaptado.

- faz hidro 2x / caminhada n. pag.

- faz uso dugma (bombinha)

11/12 P = 5.7 med / Perc. 7.1
23 m. de uso: 6h51'
Fuga = 5.6 l/min.

04/03 P = 5.8 cmH₂O / percentil: 7.0
24 m. de uso: 6h42min Bem adaptado
fuga: 4.8 Natacha
IAH = 3.2

03/06/24 P = 5.6 med / 7.0 percentil
IAH = 3.4 e/h (2.6 central)
m. de uso: 6h54m Bem adaptado
fuga: 14.6 l/m percentil SI queixas
* troca filtro
* por hidra 2x semana Natacha

26/08/24 P = 5.6 cmH₂O
IAH = 2.4 e/h
m. de uso: 6h50'
fuga = 0.3 l/min Jua

27/11/24 P = 5.5 cmH₂O P95% = 6.9 cmH₂O
IAH = 3.1 e/h (AC: 2.1) * troca filtro
m. de uso: 7h30' Siem
fuga = 11 l/min

10/02 P = 6.6 perc. / mediana 5.5
25 IAH = 3.4 e/h
m. de uso: 7h24
fuga 13.3 l/min Jua

12/05/25 P = 5.5 cmH₂O P95% 6.6 Auto 5 a 7 cmH₂O
IAH = 3.0 e/h
fuga = 5 l/min
m. de uso = 8 horas Siem

Nome: JOSE EGIDIO ANDREACI

Data de Nascimento: 23-4-1959

IMC: 30,32

Sexo: Masculino

Data do exame: 17-08-2022

Peso: 95 kg

Altura: 1,77 m

Médico: DR. BRUNO DE ANDRADE

SOARES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 17-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 504,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,5 e 166,5 minutos. O tempo total de sono foi de 428,0, eficiência de 84,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 75,2%; estágio N3: 4,0%; sono REM: 18,2%. O índice de despertares foi de 49,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 73,0/hora, sendo elas 95 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 114 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e mínima de 66%, permanecendo 41,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 70 bpm e NREM de 47 - 70 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 73,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=66%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57