

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

FLAVIO PAIVA TINOCO

IDADE: 52 PESO: 95 ALTURA: 185 PROFISSÃO:

SINTOMAS: Roncos presenciados

QUEIXAS: Laringia e ↓ coarctação devido medicamentos

MEDICAMENTOS: Diazepam / Olanzapina / Quetiapina / Magnésio
Omega 3 / Valproato

MÉDICO: Dra. Catarina (Otorrinolaringologista)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Academia / natação 3x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: ± 23h HORA QUE ACORDA: 58h

COCHILHO: () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 4/2

SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Bipolaridade (± 1 ano)

CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(S) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

22/04/25 Avaliação

Masc. dream uwp (N)

Natasha

29/04/25 P=4,3 cm H₂O

IAH=6,6 e/h

m de uso: 5h5'

Oriento colocação

da máscara e higienização

Natasha

13/05 P=9,0 cmH₂O Peti mais atento e responsivo
25 IAH=4,3 e/h
mdc uro: 6h
fuga: 36' *Natasha*

10/06 P=8,2 cmH₂O Realiza 30' caminhada 3x semana
25 IAH=3,4 e/h
mdc uro: 8h 23'
fuga: 1h 34' *Tuoco filho*
Natasha

15/07
2005 P=8,6 cmH₂O Percentil: 11,5 cmH₂O Auto 7 a 12 cmH₂O
IAH=3,4 e/h
m uro: 8h 20'
fuga: 30min *Silvia*

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: FLAVIO PAIVA TINOCO			
Sexo: M	Idade: 52 anos	Peso: 95 Kg	Altura: 1.85 m
IMC: 27.8	Data do Exame: 21/03/2025	Exame: 00365_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:42:00 PM horas e encerrado às 5:56:29 AM horas, com latência para o sono de 41 minutos e latência para o sono REM de 163 minutos. O tempo total de sono foi de 285.5 minutos, com eficiência do sono de 75.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.8%	Até 5%
Estágio 2	73.6%	45 - 55%
Estágio 3	7.4%	> 15%
Sono REM	17.3%	20 - 25%
Eficiência do sono	75.5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 51.5 minutos ocorreram **179 despertares (índice de 37.6 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 64 bpm , a maior de 94 bpm e a menor de 56 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 196 eventos respiratórios, sendo 0 central e 196 obstrutivos. Sendo 166 apnéias, 30 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 41.2/hora**, sendo 34.9 apnéia/hora e 6.3 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 21.4 e a duração máxima de 37.1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 60.6/hora, sendo 58.2 apnéia/hora e 2.4 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 96%, sendo a **saturação média de 93%**, a **maior de 98%** e a **mínima de 81%**, permanecendo 13.2 minutos (3.5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 196 dessaturações. Índice de dessaturações: 39.1/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 39.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 39.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.