

Instituto do Sono

Rua Marselhesa, 500 - Vila Clementino

São Paulo - SP - CEP 04020-060

Tel.: (11) 2108-7777

Nome: WEBER JOSE DA SILVA URSI

Sexo: Masculino Idade: 65 anos Atendimento: 18393979

Exame: 34564377 Data: 15/02/2025 ID: 3497717

Médico Solic.: ALEXANDRE COELHO MARQUES

A polissonografia basal mostrou:

- Aumento moderado do índice de apneia/hipopneia devido a eventos obstrutivos predominantes em posição supina (IAH:19,6 eventos/h);
- Registro de ronco durante o exame;
- Períodos de dessaturação da oxi-hemoglobina durante o sono;
- Aumento do sono de ondas lentas;
- Eficiência do sono preservada;
- Ausência de atividade eletroencefalográfica com características epileptiformes ou movimentos anormais durante o registro.

MARIANA DELGADO FERNANDES

CRM 179521

WEBER JOSE DA SILVA URSI; 3497717 **Instituto do Sono**

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino

São Paulo – SP – CEP 04020-060

Tel.: (11) 2108-7777

Nome: WEBER JOSE DA SILVA URSI

Sexo: M Idade: 65 anos Atendimento: 18393979

Peso: 75.0 Kg Altura: 175.0 cm IMC: 24.5 Kg/m² Data: 15/02/2025

Exame: 34564377

ID: 3497717

Médico solicitante: Dr(a). ALEXANDRE COELHO MARQUES

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 22:47:46 horas e finalizado às 06:16:04 horas.

A **latência para o**

início do sono foi de 2.0 minutos e **a latência para o início sono REM**, de 13.5 minutos. O **tempo**

total de sono (TTS) foi de 425.5 minutos, com **eficiência do sono** de 94.9%. A distribuição dos

estágios do sono mostrou 4.8% de **estágio N1**, 35.3% de **estágio N2**, 40.1% de **estágio N3** e 19.9%

de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 20.8 minutos. Ocorreram 44

despertares, uma média de 6.2 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros**

durante o sono (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 3.4 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 139, sendo 21 apneias

obstrutivas, 23 apneias centrais, 6 apneias mistas, 89 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais

e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O

índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 19.6 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de

19.6 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 16.30 por hora e o **índice de**

apneia/hipopneia central (IAHC), de 3.20 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 96%; a **média**, 92% e a **mínima**, 83%.

O **índice de dessaturação** foi de 10.7 por hora durante o sono REM e 20.0 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 3.5% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Instituto do Sono

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino

São Paulo – SP – CEP 04020-060

Tel.: (11) 2108-7777

Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); cânula de pressão (fluxo aéreo) e termistor (fluxo oronasal); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxi-hemoglobina – SpO2); capnometria (PETCO2); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Análise do sono

Data e horário de início Data e horário de término Tempo total de registro (TTR) Tempo total de sono (TTS) Latência para o início do sono Latência para o sono REM Tempo em vigília após adormecer Eficiência do sono (TTS/TTR x 100) **Estágios do sono**

15/02/2025 22:47:46

16/02/2025 06:16:04

448.3 min

425.5 min

2.0 min

13.5 min

20.8 min

94.9%

N1 N2 N3 REM Vigília

Duração (min) 20.5 150.0 170.5 84.5 20.5

Distribuição no TTS (%) 4.8 35.3 40.1 19.9 *

Despertares**Eventos Índice (por hora)**

Total de despertares 42 5.9

Frequência cardíaca**Média (bpm) Máxima (bpm)**

Total 49.0 54.0

REM 49.9

NREM 48.7

Vigília 56.8

Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - periodic limb movements in sleep)**EMG tibial bilateral Eventos Índice (por hora)**

PLMS 24 3.4

PLMS associados a despertares 0 0.0

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

WEBER JOSE DA SILVA URSI, 3497717, 18393979 **Instituto do Sono**

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino

São Paulo – SP – CEP 04020-060

Tel.: (11) 2108-7777

Eventos respiratórios**Total de****eventos****Índices (por hora) Duração (seg)****REM NREM TTS Supino****Não****supino Máxima Média**

Apneia obstrutiva (AO) 21 0.0 3.7 3.0 5.8 0.52 22.5 15.8

Apneia mista (AM) 6 0.0 1.1 0.8 1.8 0.00 26.5 19.7

Hipopneia obstrutiva

(HO) 89 10.7 12.7 12.5 * * 31.0 23.6

RERA 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

AO+AM+HO 116.00 10.70 39.70 16.30 * * 80.00 59.10

AO+AM+HO+RERA 116.00 10.70 39.70 16.30 * * 80.00 59.10

Apneia central (AC) 23 0 23 3.2 4.9 1.84 18.0 13.8

Hipopneia central (HC) 0 0.0 0.0 0.0 * * 0.0 0.0

AC+HC 23.00 0.00 23.00 3.20 * * 18.00 13.80

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 16.30 (por hora)

IAH(O+C): 19.6 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 3.20 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: 14.6 (por hora) em supino e 10.76 (por hora) em não

supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 19.6 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.

- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença

de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.

- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.

- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.

- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

Saturação da oxi-hemoglobina (SpO2)

Saturação média 92% Saturação TTR < 90% 3.5% (15.8 min)

Saturação mínima 83% Saturação REM < 90% 0.1% (0.4 min)

Saturação NREM < 90% 3.3% (14.7 min)

Saturação média na vigília 93%

Saturação média no sono REM 93% Saturação < 80% 0.0% TTR (0.0 min)

Saturação média no sono NREM 92% Saturação < 70% 0.0% TTR
(0.0min)

Total de dessaturações 130

Índice de dessaturação no sono Índice de dessaturação no sono
REM Índice de dessaturação no sono NREM 18.4 (por hora)

10.7 (por hora)

20.0 (por hora)

WEBER JOSE DA SILVA URSI, 3497717, 18393979WEBER JOSE DA SILVA
URSI, 3497717, 18393979