

Exame

Nome	Luis Otávio de Souza	Nascimento	21/11/1960 (64 anos)	Sexo	Masculino
Início	24/10/2025 - 00:34:36	Tempo total	05:01:42 (301,7 min)		
Fim	24/10/2025 - 05:36:18	Tempo válido	04:55:06 (295,1 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 23/10/2025

Peso 95 kg
Altura 1,68 m
IMC 33,7

Medicamentos

Não respondido

- ☐ Nenhum


Sintomas Não respondido

- ☐ Nenhum
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Não respondido

- ☐ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)


IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 24/10/2025, iniciado às 00:34 e terminado às 05:36. O tempo total de registro foi de 5h01min (301 minutos) e o tempo válido foi de 4h55min (295 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 15 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 3,0/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Não foram detectados eventos de ronco durante o registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 3,0/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	Luis Otávio de Souza	Nascimento	21/11/1960 (64 anos)	Sexo	Masculino
Início	24/10/2025 - 00:34:36	Tempo total	05:01:42 (301,7 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca




Sono estimado

Tempo total de sono	253,0 min
Tempo para dormir	14,5 min
Tempo acordado pós-sono	30,5 min
Eficiência do sono	84%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 8,1 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	300,0 min
Tempo com ronco	0,0 min (0%)



Polissonogramas

