

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: LUIS OTAVIO DE SOUZA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 31-01-2025

Idade: 64 anos

Peso: 92 kg

Altura: 1,68 m

Médico Solicitante: DR. SAYURI HIRAYAMA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 31/01/2025 21:51 e finalizado às 01/02/2025 05:46.

A latência para início do sono foi de **20,0 min** e a latência para o sono REM de **140,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 335,0 min, com eficiência do sono de **70,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,2 %** de estágio N1, **55,2 %** de estágio N2, **21,3 %** de estágio N3 e **21,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 119,5 min. Ocorreram 87 despertares, sendo o índice de **11,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 88, sendo 12 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 76 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **15,8 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 16,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 15,7. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 15,8 (nº/h), sendo 2,1 apneia/h e 13,6 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 93%, a **média** de 92% e a **mínima** de 80%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 10,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 11,0 (nº/h) e em NREM foi de 15,5 (nº/h). Permaneceu 10,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: LUIS OTAVIO DE SOUZA

Data do Exame: 31-01-2025

pág. 1

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (15,8 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina reduzida (80%);
3. Latência para o início do sono normal (20,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (140,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída (70,6 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (11,0 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (2,2 %) (VN= 2% a 5%);
8. Ligeiro aumento do percentual do estágio N2 (55,2 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (21,3 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (21,2 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, intermitente verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total	de	87	11,0
despertares			

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	62,0	132
NREM	61,7	167
Vigília	65,4	167

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	12	0	12	76	88	0	88
Índice	0,0	2,1	0,0	2,1	13,6	15,8	0,0	15,8
Índice em REM	0,0	4,2	0,0	4,2	11,8	16,1	0,0	16,1
Índice em NREM	0,0	1,6	0,0	1,6	14,1	15,7	0,0	15,7
Duração máx (seg)	0	26,0	0	26,0	55,3	55,3	0	55,3
Duração média (seg)	0	20,2	0	20,2	24,1	22,2	0	22,2
Índice em Supino	0	3,0	0	3,0	16,2	19,2	0	19,2
Índice em Não Supino	0,0	0,9	0,0	0,9	10,0	10,8	0,0	10,8

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 15,8 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 15,8 (nº/h)

DADOS DO PACIENTE:

Nome: LUIS OTAVIO DE SOUZA
ID: 0
Altura: 1,68 m
Peso: 92 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 21-11-1960
IMC: 32,60

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:51:51
Data do Exame: 31-01-2025
Médico Solicitante: DR. SAYURI HIRAYAMA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	31/01/2025 21:51
Data/Horário de Término:	01/02/2025 05:46
Tempo Total de Registro (TTR):	474,5
Tempo Total de Sono (TTS):	335,0
Latência para o início do sono:	20,0
Latência para o sono REM:	140,5
Tempo acordado após o adormecer:	119,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	70,6 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	7,5	185,0	71,5	71,0	139,5
% de TTS	2,2	55,2	21,3	21,2	29,4

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	92%	80%
NREM:	92%	80%
REM:	91%	84%
Vigília:	93%	62%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 93%

Total de dessaturações: 81

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/


DADOS DE BRUXISMO:


TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (occurrences/h)	0,0
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	3	0	9	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	13	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	1	0
SUPINO	0	7	0	44	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	70,6 %	≥85%
Latência para o início do sono	20,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	140,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	2,2 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	55,2 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	21,3 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	21,2 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	29,4 %	5%
Índice de despertares	11,0 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	15,8 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h