

22221021569

ANTONIO ALVES CURSINO			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS		Cansado / confuso / memória ruim	
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA		6h - 7:30	
HORA QUE DORME		22:30	
PRÁTICA EXERCÍCIO			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
07/10	$P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 0.5/lv$ M. de uso: 6h52' sem adaptado		fua
24/10	$P = 8.9 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 0.8/lv$ M. de uso: 6h50'		fua
01/11	$P = 8.4 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 0.3/lv$ M. de uso: 7h26'	TROQUEI a máscara. p/ aluf.	fua
18/11	$P = 8.8 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 0.4 e/lv$ M. de uso: 7h44' Fuga = 25.4 l/min.	Relata melhora da sono língua, rouco.	fua
02/12	$P = 8.5 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 0.8 e/lv$ M. de uso: 8h2' Fuga = 25 l/min	Relata estar bem adaptado a másc.	fua
22/12	$P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$ $IAH = 0.2 e/lv$ M. de uso: 8h.		
16/05	$P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$ M. de uso: 8h23' $IAH = 0.3 e/lv$ monitorei Fuga = 5.0 l/min	TROCO O FILTRO 2880 Horímetro	fua
Retirou a medicação p/ alzheimer.			
16/06	$P = 8.6$ $IAH = 2.4$ M. de uso: 7h40' Fuga = 29.5		fua. não se mexe

17/08
23 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta \text{AH} = 0.7 \text{ e/h}$
m. de uso: 8h59'
fuga = 34.2 l/min.

Bem adapt.

Jua Cláudia

19/10
23 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta \text{AH} = 1.5 \text{ e/h}$
m. de uso: 28.6 l/min

Jua Cláudia

01/12
23 $P = 8.6$
 $\Delta \text{AH} = 1.6 \text{ e/h}$
m. de uso: 8h24'
fuga = 27.4

Troco o filtro e fixador.

Jua

11/01
24 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 8h35'
 $\Delta \text{AH} = 0.4 \text{ e/h}$
fuga = 12.8 l/min.

Bem adaptada, s/ queixas.

Jua Cláudia

14/03
24 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 9h6'
 $\Delta \text{AH} = 0.5$
fuga: 0.2 $p95: 11.8$

Bem adaptado
Troco máscara nasal
Oriento higiene
Troco filtro

Natasha

17/06/24 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta \text{AH} = 0.7 \text{ e/h}$
m. de uso: 8h54m
fuga: 8.8 l/min (percentil)

Bem adaptado
s/ queixas
* troco filtro

Natasha

12/09
24 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta \text{AH} = 1.0 \text{ e/h}$
m. de uso: 8h35'

Bem adapt., s/ queixas.
Porém, está tendo alguns
esquecimentos. Jua

20/02
25 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta \text{AH} = 4.5 \text{ e/h}$
m. de uso: 9m.
fuga = 2.4 l/min.

Bem adaptado ↑ o peso
($P = 90 \text{ kg}$)
Jua Cláudia

Comprou o CPAP que ela estava —

17/04/25 P=9cmllO
IAH=1.7 e/ev
m. de uso: 8h50'

Bem adaptado

guar.

29/05/25 P=9cmllO
IAH=1.6 e/ev
m. de uso: 8h50'
Dormindo bem.

Ana Claudia

Nome: Antonio Alves Cursino
Data de Nascimento: 15-5-1952
IMC: 27,40
Sexo: Masculino
Data do exame: 07-09-2022

Peso: 82 kg
Altura: 1,73 m
Médico: Dra. Maria Cecilia Menezes Pires
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-09-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 465,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 45,0 e 108,0 minutos. O tempo total de sono foi de 338,5, eficiência de 72,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,5%; estágio N2: 59,1%; estágio N3: 16,7%; sono REM: 20,7%. O índice de despertares foi de 25,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 47,0/hora, sendo elas 52 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 144 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 79%, permanecendo 4,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 74 - 92 bpm e NREM de 75 - 95 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 47,0/hora; *até 5/ev*
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (9,7/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.
Presença de bruxismo.**

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57