

22222041449 DN 414

ADÃO CECILIO DA PAIXÃO			
MEDICAMENTOS:	Domarem / Patz		
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência / memória		
BANHEIRO	1 a 2x		
HORA QUE ACORDA	6	58,3h	
HORA QUE DORME	23		
PRÁTICA EXERCÍCIO	Não		
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
03/10 22	P = 4 - 14 cmH ₂ O - Jua		
31/10 22	P = 10,5 IAH = 2,8 m. de uso: 3h45' Jua		
16/11 22	P = 10,7 cmH ₂ O IAH = 3,1 e/ev m. de uso: 3hrs Jua		
23/11 22	P = 11,2 cmH ₂ O IAH = 3,0 e/ev m. de uso: 4h20' Fuga: 29,2 l/min. Ana claudia		
30/11 22	P = 10,7 cmH ₂ O IAH = 3,3 e/ev m. de uso: 3h15'		
19/12 22	P = 9,6 cmH ₂ O m. de uso: 3hrs Fuga = 24,3 e/min IAH = 2,4 e/ev Bem adaptado		
07/02 23	P = 10,2 - mediana 8,2 Fuga = 23,2 l/min IAH = 2,3 e/ev m. de uso: 23,2 l/min Jua		
31/03 25	P = 1 IAH = m. de uso = P = 125 Kg. Parou de usar		



11/04
25

P: 7,2 cmH₂O

PSO%: 40,1 cmH₂O

Auto 4 à 12

IAH: 4,9 cl/h

muro: 4 R/min

fuga: 36 l/min

} Deixo Auto 6 à 10,6 cmH₂O
Prampa 5 cmH₂O 5 min

} não se adaptou a Pillow Dream Wear Selva
} manteve um. da sutof (L) que ele tinha
↳ troquei Almofada nova

Nome: ADÃO CECILIO DA PAIXÃO

Data de Nascimento: 22-11-1959

IMC: 44,82

Sexo: Masculino

Data do exame: 22-08-2022

Peso: 125 kg

Altura: 1,67 m

Médico: DR. FLAVIO HENRIQUE GENESI

GOES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 419,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 4,0 e 85,5 minutos. O tempo total de sono foi de 382,0, eficiência de 91,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 57,9%; estágio N3: 19,2%; sono REM: 20,5%. O índice de despertares foi de 37,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 58,3/hora, sendo elas 78 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 164 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 71%, permanecendo 8,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 79 bpm e NREM de 46 - 81 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 58,3/hora; - 5/2v
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco no traçado.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157