

BENEDITO SERGIO RODRIGUES 58a. - Engenheiro	
MEDICAMENTOS:	Losartana / estalopram /
SINTOMAS/QUEIXAS	dipressão / HAS / memória / Fadiga
BANHEIRO	1x
HORA QUE ACORDA	6
HORA QUE DORME	22
PRÁTICA EXERCÍCIO	não faz
Respiração:	mista
SpO ₂	79%
CAFE:	Sim
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
ALMOÇO:	Sim
LANCHE:	Sim
JANTA:	Sim
24/01	P = 10.6 cmH ₂ O
23	IAH = 1.4 e/ev
	M. de uso: 5h20'
	Fuga: 41 l/min
27/02	* estava tomando melatonina
23	P = 9.2 cmH ₂ O - Perc. 10.5
	Fuga 22.2 - 41.2
	IAH = 0.9 e/ev
28/04	P = 9.1 cmH ₂ O
23	M. de uso: 4h45
	Fuga: 25 e/min
	IAH = 0.6 e/ev
26/03	- Comprimido prong G DreamWear
25	

Descrição do Exame Polissonográfico

Titulação Manual de Aparelho de Pressão Positiva

Nome: Benedito Sergio Rodrigues			
Sexo: M			
IMC: 28,4	Idade: 52 anos	Peso: 81 Kg	Altura: 1,69 m
Médico solicitante: Dr. Luciano Rotella	Data do Exame: 12/02/2017	Exame: 20158_01	

COMENTÁRIOS:

Exame realizado em Laboratório de Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno. Os parâmetros eletrofisiológicos e cardiorespiratórios foram registrados em sistema computadorizado (ICELEA): eletroencefalograma, eletromiograma submentoniano e tibial, eletrooculograma, eletrocardiograma, fluxo de ar oronasal, movimento de abdômem e caixa torácica, microfone, saturação de oxihemoglobina, e posição no leito. O paciente foi estudado em ar ambiente. Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2016. (AAMS)

Exame iniciado às 22:13:39 horas e encerrado às 05:47:34 horas, com latência para o sono de 3 minutos e latência para o sono REM de 11 minutos. O tempo total de sono foi de 423,0 minutos, com eficiência do sono de 93,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,2% de estágio 1, 37,5% de estágio 2, 28,5% de estágio 3, e 30,9% de sono REM. No período total de sono permaneceu 31,0 minutos acordado e ocorreram 57 despertares.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 54 bpm, a maior de 62 bpm e a menor de 49 bpm.

Foram identificados 15,9 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 25 eventos respiratórios, sendo 4 centrais, 21 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 3,5/hora, sendo 0,7 apnéia/hora e 2,8 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 6,9/hora, sendo 0,5 apnéia/hora e 6,4 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 95%, a maior de 99% e a mínima de 79%, permanecendo 2,8 minutos (0,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 43 dessaturações.

B...s.t. S. J. 12 N. J. 12

Solvent. CPAP com

2. 9 cm / 1/2"

e 1.1-1013 72

1 m² d. 050

~~Dr. Luciano Rotella
Otorrinolaringologista
CRM 111556~~

20/FEB/17

Descrição do Exame Polissonográfico
Polissonografia basal

Polissonografia basal

Nome: Benedito Sergio Rodrigues			
Sexo: M	Idade: 52 anos	Peso: 82 Kg	Altura: 1,69 m
IMC: 28,7	Data do Exame: 05/02/2017	Exame: 10138_01	
Médico solicitante: Dr.(a) Dr Luciano Rotella			

COMENTÁRIOS:

Exame realizado em Laboratório de Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno. Os parâmetros eletrofisiológicos e cardiorespiratórios foram registrados em sistema computadorizado (ICELERA): eletroencefalograma, eletromiograma submentoniano e tibial, eletrooculograma, eletrocardiograma, fluxo de ar oronasal, movimento de abdômen e caixa torácica, microfone, saturação de oxihemoglobina, e posição no leito. O paciente foi estudado em ar ambiente. Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2016.(AAMS)

Exame iniciado às 21:02:58 horas e encerrado às 05:49:20 horas, com latência para o sono de 5 minutos e latência para o sono REM de 248 minutos. O tempo total de sono foi de 470,5 minutos, com eficiência do sono de 89,4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 26,8% de estágio 1, 47,3% de estágio 2, 9,4% de estágio 3, e 16,6% de sono REM. No período total de sono permaneceu 56,0 minutos acordado e ocorreram 412 despertares.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 60 bpm, a maior de 75 bpm e a menor de 50 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 474 eventos respiratórios, sendo 2 centrais, 472 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 60,4/hora, sendo 7,5 apnéia/hora e 52,9 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 46,2/hora, sendo 2,3 apnéia/hora e 43,8 hipopnéia/hora. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos e índice de 0,0/h.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 92%, a maior de 97% e a mínima de 74%, permanecendo 73,8 minutos (14,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 1,6 minutos (0,3%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 327 dessaturações.