

CELSON GONÇALVES

SINTOMAS / QUEIXAS: Sondência / cansaço / HAS /
 MEDICAMENTOS: losartana 100mg / docileto Píadezipina

HORA QUE DORME: 01:30 HORA QUE ACORDA: 6hs

BANHEIRO: 1 a 2x

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

PRÁTICA EXERCÍCIO: ñ faz.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

IDADE: 63 PESO: 82 IAH: 24.3 MALLAMPATI: IV SPO2: 98%

13/02 P = 4 mediana / percentil: 90

23 IAH = 2.8 e/lv fuga

fuga = 2.1 l/min.

fua

03/04 P = 7 cmH₂O

23 IAH = 2.4 e/lv

m. de uso: 4h11'

Relato: fluxo de ar intenso.

fua

16/10/24 P = 7 cmH₂O

IAH = 2.1 e/lv

m de uso: 5h4'

fuga: 2.1 l/m

Dorme tarde motivo
das poucas horas de uso

Natasha

Nome: CELSO GONÇALVES
Data de Nascimento: 19-11-1959
IMC: 28,73
Sexo: Masculino
Data do exame: 01-04-2022

Peso: 85 kg
Altura: 1,72 m
Médico: DR. LAURO CELSO S.
GONÇALVES
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-04-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo. O tempo total de registro foi de 515,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 54,5 e 133,0 minutos. O tempo total de sono foi de 326,5, eficiência de 63,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,8%; estágio N2: 54,5%; estágio N3: 19,9%; sono REM: 21,7%. O índice de despertares foi de 11,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 24,3/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 121 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 77%, permanecendo 10,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 95 bpm e NREM de 49 - 88 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 24,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=77%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157