

22131201990

CARINA DE ANDRADE RIBOURA LIMA

MEDICAMENTOS:

Idagene (PI Isclho) - Simult

SINTOMAS/QUEIXAS

Insuficiência / sangramento

BANHEIRO

3 à 4x

HORA QUE ACORDA

6hr

Respirador nasal

HORA QUE DORME

23hr - 24

ZAH = 59/a

PRÁTICA EXERCÍCIO

não

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES

CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

15 P = 5.15

22 Adaptação

21 P = 10 cmH₂O

22 IAH = 0.6 / h

22 m. de uso: 1h 10'

29/07 P = 9.2 cmH₂O

22 IAH = 1.1 / h

m. de uso: 6hr

Bem adaptada, porém não aceitou fuso

05/08 P = 8.9 cmH₂O

22 IAH = 0.9 / h

m. de uso: 5h47'

Bem adaptada, irá decidir a compra fuso

P = 8.9 cmH₂O

IAH = 0.2 e / h

m. de uso: 5hr

17/05

2023 P = 8.9 cmH₂O

IAH = 0.7 e / h

m. de uso: 6h00'

fuga: 0 e / min

Bem adaptada

* hístia hialo → precisa perder peso

segundo atividade física

↳ fuso relatado pela Ana - Dr. Edson

14/09 P = 9.0 cmH₂O

23 IAH = 0.6 e / h

m. de uso: 5hr

11/01 P = 9.0

24 IAH = 0.6

m. de uso: 6:00

fuso

15/03/24 $P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/l}$
m. de uso: 7h

Bem adaptada
Natacha

17/05
24

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,7 \text{ e/l}$
m. de uso: 4:00 mas

Bem adaptado

19d $\downarrow 4,0 \text{ cmH}_2\text{O}$.

14/02
25

Tiro aparelho por BMC.
Acordado mesmo valor de locação.

28/02
25

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,0$
m de uso: 6h

$\downarrow P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
Aparelho não está
entrando a rampa

Natacha

10/06/25

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m de uso: 5h
fuga: 0,14/m

Esta usando placa de
buxismo

costa memória cheia
fez leitura de 1d corrente

Natacha



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PRAGMÁTICO

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Ortopedia e Traumatologia
Especialista em Medicina do Sono
Médico em Regulação pelo LACT
Curso de Especialização pelo LACT
CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Médica de Sono
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 62.858

Carina de Andrade Ribeiro Lima

Solicito o aluguel/ venda do CPAP
para o tratamento da síndrome da apnéia
obstrutiva do sono.

Fiz a polissonografia, sendo
o IDR: 59/hora.

Atte,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

SJC, 19/5/21

Dr. Alberto Jorge Remesar L
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DE SONO E APNEIA DO SONO
Pneumologia

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Especialista em Pneumologia e Sono
Médico de Sono e Apneia do Sono
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Carina de Andrade Riboura Lima
EXAME nº: 4860
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 02/04/2021
IDADE: 45 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h55min e concluído às 06h16min. A latência para o sono foi de 28 minutos e a latência para o estágio REM, de 278 minutos. O tempo total de sono foi de 321,5 minutos (05h21min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 75,7%. A distribuição do sono mostrou 21,9% de estágio 1, 46,2% de estágio 2, 25,3% de estágio 3 e 6,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 74,5 minutos em vigília, ocorreram 188 microdespertares (índice: 35,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 59/hora, sendo 12,5 apneia/hora e 46,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 59/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a média de 69% e a mínima de 76%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono

TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (índice: 59/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (59/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 65; máxima: 84 bpm.

O ronco foi intermitente e médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 28 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (278 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 75,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 35,1/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante do cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,9%; normal: 8-10%) e 3 (25,3%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (6,5%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (46,2%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonoência de Epworth: 4 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Descrição do Exame Polissonográfico

1/5

Nome: CARINA DE ANDRADE RIBOURA LIMA			
Sexo: F		Idade: 45 anos	
IMC: 33,2	Data do Exame: 24/09/2021	Peso: 85 Kg	Altura: 1,60 m
		Exame: 11003_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:30:42 horas e encerrado às 06:02:07 horas, com latência para o sono de 39 minutos e latência para o sono REM de 104 minutos. O tempo total de sono foi de 362,0 minutos, com eficiência do sono de 80,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	3,7%	Até 5%
Estágio 2	53,5%	45 - 55%
Estágio 3	24,4%	> 15%
Sono REM	18,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	80,0%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 51 minutos ocorreram **110 despertares** (índice de **18,2/hora**).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71 bpm, a maior de 83 bpm e a menor de 59 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**, e **0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 151 eventos respiratórios, sendo 0 central e 151 obstrutivos. Sendo 53 apnéias, 98 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 25,0/hora**, sendo 8,8 apnéia/hora e 16,2 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17,9 e a duração máxima de 33,1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 31,6/hora, sendo 8,1 apnéia/hora e 23,5 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **95%**, sendo a saturação **média de 90%**, a **maior de 96%** e a **mínima de 76%**, permanecendo 134,2 minutos (29,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,3 minutos (0,1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 184 dessaturações. Índice de dessaturações: 30,5/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 33,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 30,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Guilherme Salomoni de Domicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842