

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Carlos Alberto Alves Cairo

Data de nasc. 16/06/1959 (64 anos)

Sexo Masculino

Exame

Início 19/12/2023 – 23:26:20

Fim 20/12/2023 – 06:37:58

Tempo total 07:11:38 (431,6 min)

Tempo válido 07:05:45 (425,8 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool☐ Congestão nasal☐ Sedativos☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP☐ Aparelho de avanço☐ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 19/12/2023

Peso 85 kg

Altura 1,80 m

IMC 26,2

Sintomas

Respondido em 19/12/2023


☒ Ronco alto e frequente☐ Dificuldade para manter o sono☐ Sono agitado☒ Sono não reparador☒ Sonolência ou cansaço diurno☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil☒ Dificuldade de concentração☒ Perda de memória☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 19/12/2023

☐ Hipertensão arterial sistêmica☒ Doença arterial coronária☐ Insuficiência cardíaca☐ Arritmia cardíaca☐ Acidente vascular cerebral (AVC)☐ Diabetes☐ Depressão☐ Refluxo gastroesofágico☐ Doença respiratória☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 19/12/2023, iniciado às 23:26 e terminado às 06:37. O tempo total de registro foi de 7h11min (431 minutos) e o tempo válido foi de 7h05min (425 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 37 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 5,2/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 2% do tempo de registro (12 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 1% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 5,2/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:


1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 e 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Ali Azarbarzin et al, 2020).

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	86%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	12,3 min (2%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	37
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	5,2 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	2,2 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Carga hipóxica - Hypoxic burden


Carga hipóxica (CH) **34,7 %min /hora**

Risco cardiovascular



Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	51 bpm
FC média	70 bpm
FC máxima	107 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	323,0 min
Tempo para dormir	15,5 min
Tempo acordado pós-sono	91,0 min
Eficiência do sono	75%

Análise de ronco

Tempo de gravação	430,0 min
Tempo com ronco	3,0 min (1%)



Polissonogramas

