

NS

ERICSON JOSE FERREIRA MONTEIRO

RE 45 anos PESO: 105 ALTURA: 1,70 PROFISSÃO: Atendente Rest. japonês
 SINTOMAS: Ronco, sono fragmentado, Sonolência diurna.
 QUEIXAS:
 MEDICAMENTOS: X

MÉDICO: Dr. Luiz Sérgio

EXERCÍCIO FÍSICO: X

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h30' HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO Esporádico

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há 10 anos.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Boca BANHEIRO: 6x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: IDR: 70,2% SPO2: 69%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Desvio Septo - OK.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS

20/12/23 Adaptação Auto 4 a 12 cmH₂O

04/01/24 Esqueceu o CPAP, porém relata que
 está apresentando fobia q o CPAP, mas
 está acordando as 2hs dorme de novo
 e retiro 4hs.
 Banheiro 1a 2x

08/01 P = 9,4 cmH₂O - 10,7 cmH₂O.

24 IAH = 13,2 e/h

M. de uso: 5h40'

Sem adaptação, 4 queixas, melhora
 da sonolência, sono fragmentado.

22/01 P = 11 cmH₂O - percentil 8.0.

24 IAH = 10,7 e/h

M. de uso: 4hs

Coloco em pressão fixa

14/02/24 P = 8 cmH₂O

IAH = 8,5 e/h

M. uso = 3h27'

fuga = 6 l/min

- leve apnéia intermitente

- melhora da disposição/sonolência

↑ Pmáx: 5 cmH₂O. ↑ P: 9 cmH₂O18/03/24 P = 9 cmH₂O

IAH = 7 e/h

M. de uso: 2h42'

Oriento o uso constante.

Relata ter feito alt. no
horário de dormir.

08/04/24 P: 9 cmH₂O
IAH = 6,8 e/h
m. de uso: 2h 33min
Quase tira a máscara durante a noite involuntariamente.
Dificuldade pl iniciar o sono (ansiedade)

Natasha

07/05/24 P: 8,9 cmH₂O
IAH = 7,7 e/h
m. de uso: 3h 20
fuga: 02 e/m
Relata ainda retirar a máscara involuntariamente

Natasha

11/06/24 P: 8,9 cmH₂O
IAH = 8,1 e/h
m de uso: 3h 38m
fuga: 6,4 e/m
Dorme antes de colocar a máscara
Oriento colocar o CPAP logo ao ir p/cama

Natasha

08/07/24 P: 9 cmH₂O / ↑ P: 9,5 cmH₂O
IAH = 7,1 e/h
m de uso: 3h 44m
fuga: 8,3 e/m
Ainda mantém uso irregular da apulho

Natasha

05/08/2024 P: 9,5 cmH₂O
IAH = 9,0 e/h
m uso = 4h 13min.
fuga = 6,4 e/min
sono interrompido / dorme tarde
nigiro atindade fínica silva

02/09/24 P: 9,5 cmH₂O
IAH = 9,3 e/h
m uso = 4h 12'
fuga = 5 e/min
em gripe / mta tosse - ficou alguns dias
nigiro atindade fínica
AP: 10 cmH₂O silva

11/11/24 P: 10 cmH₂O
IAH = 5,8 e/h
m uso = 3h 35min
fuga = 4 e/min
(Andei alguns dias com IAH ↑ 10)
AP: 10,5 cmH₂O silva

13/01/2025 P: 10,5 cmH₂O
IAH = 4,3 e/h
m uso = 4h 11min
fuga = 2,8 e/min
Bem adaptado.
nigiro atindade fínica / Alimentação.
silva

17/03/25 P= 10,5 cm H₂O

FAH= 4,6 e/h

maneo: 3h49'

fuga: 1,8 l/m

Relata o Trabalho

muito agitado e

locala retirando o

masca de madureza

oriento colocar microscópio

no fixador.

Natacha

16/06/25

P= 10,5 cm H₂O

FAH= 4,8 e/h -

maneo= 4h38min

fuga= 3l/min

documento

Silvia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ERICSON JOSE FERREIRA MONTEIRO			
Sexo:	Idade: 45 anos	Peso: 102 Kg	Altura: 1.70 m
IMC: 35.3	Data do Exame: 04/09/2023	Exame: 12804_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:08 PM horas e encerrado às 5:33:51 AM horas, com latência para o sono de 21 minutos e latência para o sono REM de 287 minutos. O tempo total de sono foi de 354.5 minutos, com eficiência do sono de 80.4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.8%	Até 5%
Estágio 2	87.2%	45 - 55%
Estágio 3	7.9%	> 15%
Sono REM	3.1%	20 - 25%
Eficiência do sono	80.4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 65.5 minutos ocorreram **461 despertares (índice de 78.0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 74 bpm, a maior de 86 bpm e a menor de 65 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 415 eventos respiratórios, sendo 0 central, 415 obstrutivos e 0 misto. Sendo 398 apnéias, 17 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 70.2/hora**, sendo 67.4 apnéia/hora e 2.9 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 26.7 e a duração máxima de 44.5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 70.9/hora, sendo 70.9 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%**, sendo a saturação média de **90%**, a maior de **99%** e a mínima de **69%**, permanecendo 104.5 minutos (23.7%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 11.2 minutos (2.5%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 417 dessaturações. Índice de dessaturações: 70.6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 71.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 71.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Dominici
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842