

INDICADO POR: Paciente (marido)
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

GLAUCIA GIOVANELLI CUNHA

IDADE: 61 PESO: 80 ALTURA: 1,58 PROFISSÃO: Aposentada
SINTOMAS: refluxo

QUEIXAS: ronco, tosse sufocada, sonolência diurna
MEDICAMENTOS: lorantadina, atorvastatina (colesterol), Disimbi (Antidiarréico)
hormônio hormonal: suplementos

MÉDICO: Dr. Pedro Paulo

MARCAPASSO: () JS ☒ IN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () JS ☒ IN

EXERCÍCIO FÍSICO: musculação 2x sem, caminhada

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h30'

HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO () JS () IN ☒ ☒ DORME ACOMPANHADO: () JS () IN () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () JS () IN ☒ / DORMEM NO QUARTO: () JS ☒ IN

PET NO QUARTO: () JS ☒ IN

BEBIDA ALCOÓLICA: () JS () X NA SEMANA () IN pois há em 15 dias

FUMO: () JS () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 42,6 e/h SPO2: 80%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Colesterol / endoglicose → distúrbio intestinal
lipídios (MMII) → sintomas 6 meses
antimicrobiano

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () JS ☒ IN

SPO2 C/ CPAP: /

PRESSÃO NO EXAME: /

25/11/24 Intubação Intubação 42 40cmH2O Máscara Dream Wear (M)

02/12/24 P = 7,7 med - Percentil - 9,7

m. de uso: 7h3'

pressão = 180

IAH = 4,4 e/h

Rolada resaca da boca

nos últimos 3d. da IAH = 30 dias

14/01/24 P = 8,1 antH2O med

fixo = 8,2 cmH2O

IAH: 4,0 e/h

m. de uso: 7h15'

28/02 P = 8,0 (↓ P = 8,0)

Natarelon

P = 75kg

25 IAH = 4,1 (central 1,4) (IAH = 3,1)

pressão 22 epu

m. de uso: 6h40'

fixo

26/03/25 P: 8.2 cm H₂O

$$I_{AH} = \underline{4.9} \text{ e.u.}$$
$$m_{\text{urea}} = 6.24 \text{ g}$$

Temp: 101 min

queixa de estar roncando

↑ P: 8,6 cm H₂O

Silmi.

28/04 $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$

25 IAH = 4.3 e/w

M. de uso: 5h47'

fuga = 1.0

$$IC = 1.3 / IA \approx 3.2$$

Shua

IDADE: 31
 PESO: 70
 ALTURA: 1.70
 IMC: 24.2
 DATA: 10/01/2024
 M. de uso: 5h47'
 fuga: 1.0
 and

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Glaucia Giovanelli Cunha

EXAME nº: 5327

SOLICITADO POR: Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo

DATA: 06/03/2023

IDADE: 59 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h38min e concluído às 05h44min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 106 minutos. O tempo total de sono foi de 402,5 minutos (06h42min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 96,3%. A distribuição do sono registrado mostrou 11,4% de estágio 1, 50,4% de estágio 2, 12,9% de estágio 3 e 25,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 14,5 minutos em vigília, ocorreram 134 microdespertares (índice: 20/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 42,6/hora, sendo 5,4 apneia/hora e 37,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 46,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 93% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (42,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (46,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 55; máxima: 71 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (106 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (96,3%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 20/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,4%; normal: 8-10%), 3 (12,9%; normal: 10-12%) e REM (25,2%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (50,4%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 9 (normal até 9; máxima: 24).