

NS

SEBASTIÃO MARQUES DE ANDRADE FILHO

IDADE: 75 PESO: 102 ALTURA: 180 PROFISSÃO: Anal. Sist - Apas.
 SINTOMAS: Sonolência à tarde / Perdas cl edema
 QUEIXAS: Rence (diag. espas) - glaucoma.
 MEDICAMENTOS: Lebitah (5mg) - Renset H - Daflon 1000 - Coricil
 na

MÉDICO: Drº Carlos Alberto

EXERCÍCIO FÍSICO: Não (devido arritmia)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 7 ALMOÇO: 5 12:30 LANCHE: 5 (19) JANTAR: N.

HORA QUE DORME: 22

HORA QUE ACORDA: 7

COCHILLO () SIM (X) NÃO

DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO Final semana (Leite)

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 1989 (desde)

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 22 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 44

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: III

IAH: 64.6

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

700: 52.1

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

05/02/23 - Pico antip.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

Rinite

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

HAS

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

solapdo/pi Aritmia

15/01/24 Avaliação

(tem cocôria)

22/01
24P = 9.0 (perce) -
m. de uso: 6h22'Banheiro - 0x.
mediana 7.0. / ↓ umid 6IAH = 6.4 e/ev (AC = 4.0 / 2.4). - Ausc
Sem queixas de ronco/sonolência.P = 7.2 cmH₂O

IAH = 4.6 e/ev

m. de uso = 7h52'

29/02/24

P = 7.2 cmH₂O

IAH = 5.8 (2.8 e/ev)

m. de uso: 8h12m

Bem adaptado

Oriente eleva cabeça

Natacha

25/03
24P = 7.2 cmH₂O

m. de uso = 8h12'

IAH = 6.3 e/ev

(AC 2.5 e/ev) (IA: 3.9) fue

24/04
24P = 7.2 cmH₂O

IAH = 5.4 e/ev

m. de uso: 7h50'

Fuga = 7.6 e/ev

Bem adaptado.
fue03/06
24P = 7.2 cmH₂O

IAH = 5.4

m. de uso: 7h30'

↑ P = 7.6
↓ umidif.

Condensou água

fue.

19/02
24

$P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3.1 \text{ e/h}$
m. de uso: 8h31'
Fuga = 11.6 lpm.

Bem adaptado.

Jua

18/09
24

$P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 4.5 \text{ e/h}$
M. de uso = 7h49'
Fuga = 0,0 lpm.

ficou gripado.

Troco o filtro

Jua

23/10/24

$P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3.8 \text{ e/h}$
m de uso: 7h36'
fuga: 0,0

Trocamos aparelho por
aparelho de feito no
wifi

Natacha

22/01
25

$P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2.0 \text{ e/h}$
M. de uso: 7h
fuga = 0,0 lpm

Bem adaptado, ficou 15d.
uso (mudança)

Jua

02/05
25

$P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0.9 \text{ e/h}$
m de uso: 5h58'
fuga: 9.4 l/m

Não utilizo desde 26/03,
esposa operou o pulmão
e após a cirurgia
estragou

Natacha

04/06/25

$P = 7.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1.8 \text{ e/h}$
m de uso: 7h13'
fuga: 15.1 l/m

Bem adaptado

Natacha

Sleep Study Report

Nome do Paciente: Sebastião Marques Andrade Sirio
Nome do Médico: Eduardo R.B. Costa
Data do Estudo: 02.10.2023

Prezado Sebastião Marques Andrade Sirio,

Agradecemos por ter se submetido ao estudo do sono de noite inteira com a Tecnologia PAT. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 8 hrs, 10 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 7 hrs, 33 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI—apnea/hypopnea index) foi de 64.6. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 64.8. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 52.1. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 16.0% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, estaremos à disposição.

Atenciosamente,

Dra. Andreza Chaguri
Clínica Médica Cardiológica
CRM 196.831