

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22222628922 / 403

SUELY ZAMARRENHO SPOLON

IDADE: 67 PESO: 84 ALTURA: 172 PROFISSÃO: Adm - aposent.

SINTOMAS: Fadiga / Depressão /

QUEIXAS: cansada / vontade de deitar a tarde

MEDICAMENTOS: Foxigra / Tirox 75 (Eutalepram / Doranotem)

Depressão / DAA / AVC (30/10/23) / Noctal

MÉDICO: Drº

MARCAPASSO: () SIM / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () SIM

EXERCÍCIO FÍSICO: 3 a 4 x caminhada / 2 x pilates (2a/4a)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 7:20 ALMOÇO: 12:30 LANCHE: 16 JANTAR: 19

HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Não MALLAMPATI: IV IAH: 49.2 SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: varizes - n tem edema med 91%

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Rinoplastia

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Tireóide e m. do ombro

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Arritmia

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Nod. de mama

18/04 Acorda; toma café; lava roupa; passa roupa; corduna a casa.

- 1x na semana vai ao mercado.
- Tem frio na cabeça - - - - - frio

19/04 Orientação de ajuste de mar. tamanho SW da N30

25/04 P= 5,3 cm H₂O (mediana)
24 IAH= 3,4 e/h

m. de uso: 9h 8m Bem adaptada
fuga: 8,6 l/m S/ queixas
Oriento limpeza Natacha

02/05 P= 5,6 cm H₂O (mediana) ajuste para 4 - 7,8 cm H₂O
24 IAH= 5,2 e/h
m. de uso: 7h 54m Bem adaptada
fuga: 8,6 l/m

Natacha

26/05 P= 6,6 cm H₂O
24 IAH= 5,4 e/h
m. de uso= 7h 54'
fuga= 2,6 e/h.
Oriento ↑ al. AUD's.

fuga

16/05/24 P=6 cmH₂O
IAH=5,6 e/h
m. de uso: 7h 24m
fuga: 5,1 e/m
Bem adaptada
Natacha

06/06
24 P=6 cmH₂O
IAH=3,6 e/h
m. de uso: 8h 32m
fuga: 3,4 e/m (mediana)
Bem adaptado
Natacha

25/07/24 P=6 cmH₂O / ↑ P=6,4 cmH₂O
IAH=6,2 e/h
m. de uso: 8h 41m
fuga: 2,2 (mediana) CI queixa de rouco
Bem adaptada
Natacha

26/09/24 - ↑ P: 6,8 cmH₂O → Ana

11/10/2024 P=6,8 cmH₂O
IAH=10,4 e/h 10:9,7
m. de uso: 7h 29min
fuga: 11 e/min
↑ P: 7,2 cmH₂O

↑ notipulência / náusea
iniciou há 20 dias +/-
antidepressivo - mesmo
período que ↑ IAH.
marco retorno 20 dias Silvin

05/11/24 P=7,2 cmH₂O
IAH=6,8 e/h
m. de uso: 7h 19'
fuga: 2,5 e/m
↑ P=7,4 cmH₂O

⊗ Pti não alterou
medicamento por
houve melhora de IAH
CI alteração da punção

12/12
24 P=7,4 cmH₂O
IAH=14,3 e/h
m. de uso: 6h 20'

Natacha
trocar o pong para pldw Sue

25/02
25 P=7,4 cmH₂O
IAH=3,8 e/h
m. de uso: 8h 30'
fuga: 20,1 e/m

Bem adaptada
S/ queixas
Natacha

29/05
25 P=7,4 cmH₂O
IAH=2,5 e/h
M. de uso: 9h 16'
fuga: 16,9 e/m
Sua

3 Pilates
1 musc.
4 caminhada
Sua

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: SUELY ZAMARRENHO SPOLON			
Sexo: F	Idade: 67 anos	Peso: 82 Kg	Altura: 172,00 m
IMC: 0,0	Data do Exame: 21/03/2024	Exame: 13319_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:59:24 horas e encerrado às 06:00:43 horas, com latência para o sono de 51 minutos e latência para o sono REM de 88 minutos. O tempo total de sono foi de 299,0 minutos, com eficiência do sono de 70,5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,0%	Até 5%
Estágio 2	83,6%	45 - 55%
Estágio 3	5,4%	> 15%
Sono REM	10,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	70,5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 74 minutos ocorreram **47 despertares (índice de 9,4 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 58 bpm, a maior de 71 bpm e a menor de 53 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 245 eventos respiratórios, sendo 0 central e 245 obstrutivos. Sendo 144 apnéias, 101 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 49,2/hora**, sendo 28,9 apnéia/hora e 20,3 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17,6 e a duração máxima de 55,2.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 66,0/hora, sendo 64,0 apnéia/hora e 2,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 92%**, sendo a saturação média de 91%, a maior de 96% e a mínima de 79%, permanecendo 42,4 minutos (10,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 224 dessaturações. Índice de dessaturações: 44,9/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 56,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 44,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - número de despertares breves dentro da normalidade (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemery Tereza Marçal
Otorrinaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200